

DIOSMINEX MAX 1 g 60 tabletek hemoroidy, żylaki, obrzęk

**SIŁA MAKSYMALNEJ
DAWKI 1000 mg
zmikronizowanej diosminy**


60 tabletek

Cena: 48,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Rodzaj rejestracji Lek



Opis produktu

Opis

Na objawy choroby żylny nóg1

ból obrzęki uczucie ciężkości nóg

Jak działa Diosminex? Diosminex - skuteczność potwierdzona badaniami Lek sprawdzony przez pacjentów Szczegóły produktu

SIŁA MAKSYMALNEJ DAWKI DIOSMINY! WYSTARCZY 1 TABLETKA DZIENNIE!

leczy objawy związane z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych. Zawiera zmikronizowaną diosminę, substancję o szerokim działaniu i dobrym profilu bezpieczeństwa. Mikronizacja diosminy znacznie zwiększa jej przyswajanie.

Diosmina zawarta w leczy objawy PNŻ (przewlekłej niewydolności żylniej), gdyż:

wspiera aż 9 kluczowych obszarów układu krwionośnego nóg 1,2,3,4

- skuteczność potwierdzona badaniami

Skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych z udziałem polskich pacjentów

Wieloośrodkowe badanie obserwacyjne, obejmujące grupę 6 599 pacjentów.

Terapia lekiem wiązała się z redukcją obwodu kostki o 0,9cm

Badanie z udziałem polskich pacjentów potwierdziło, że zmniejsza nasilenie objawów związanych z PNŻ

Częstość zgłaszanych przez pacjentów objawów związanych z przewlekłą chorobą żylną, wyjściowa oraz po 60 i 120 dniach leczenia preparatem 1

Lek sprawdzony przez pacjentów

Poznaj także...

Sprawdź

Szczegóły produktu

Skład Stosowanie Opakowanie Inne informacje

DIOSMINEX MAX, 1000mg, tabletki powlekane, 30 tabletek, 60 tabletek Każda tabletkę powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna (80 mg w tabletkę powlekanej) oraz lak żółcieni pomarańczowej (0,063 mg w tabletkę powlekanej).

DIOSMINEX 500 mg, tabletki powlekane, 60 tabletek Każda tabletkę powlekana zawiera 500 mg diosminy (Diosminum) w postaci zmikronizowanej. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: produkt leczniczy Diosminex zawiera laktozę jednowodną oraz żółcieni pomarańczowej lak.

DIOSMINEX MAX, 1000 mg, tabletki powlekane, 30 tabletek, 60 tabletek

Dawkowanie Leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylniej: Zalecana dawka to 1 tabletkę raz na dobę podczas posiłku. Leczenie powinno trwać przez co najmniej 4-5 tygodni.

Objawowe leczenie w nasileniu dolegliwości związanych z żylakami odbytu: W przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu zalecana dawka wynosi 3 tabletkę na dobę przez pierwsze 4 dni, a następnie 2 tabletkę na dobę przez kolejne 3 dni. Leczenie powinno być krótkotrwałe. Jeżeli objawy szybko nie ustępują, należy wykonać badanie proktologiczne i leczenie dostosować

do jego wyniku.

Szczególne grupy pacjentów: Brak badań dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Na podstawie dostępnych danych, nie stwierdza się szczególnego ryzyka u pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

Dzieci i młodzież: Brak danych.

Sposób podawania Diosminex Max należy stosować doustnie.

DIOSMINEX, 500 mg, tabletki powlekane, 60 tabletek

Dawkowanie Leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylniej: Zalecana dawka to 2 tabletki na dobę, po jednej tabletkie rano i wieczorem.

Objawowe leczenie w nasileniu dolegliwości związanych z żylakami odbytu - W przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu dawka wynosi 6 tabletek na dobę przez pierwsze 4 dni, a następnie 4 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni.

Sposób podawania Produkt leczniczy Diosminex należy przyjmować doustnie podczas posiłków.

1000 mg, tabletki powlekane, 30 tabletek, 60 tabletek 500 mg, tabletki powlekane, 60 tabletek

Postać farmaceutyczna: Tabletka powlekana. Tabletki powlekane są zielone, podłużne, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni, bez plam i uszkodzeń.

Wskazania do stosowania: Leczenie objawów związanych z przewlekłą niewydolnością krążenia żylnego u dorosłych: uczucie ciężkości nóg; ból nóg; nocne kurcze nóg. Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu u dorosłych.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną.

Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska.

Skład

1 g maści zawiera: 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas), 5000 j.m. polimyksyny B siarczanu (Polymyxini B sulfas) oraz 400 j.m. bacytracyny cynkowej (Bacitracinum zincum).

Substancja pomocnicza: wazelina biała.

Stosowanie

DIOSMINEX MAX, 1000 mg, tabletki powlekane, 30 tabletek, 60 tabletek

Dawkowanie Leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylniej: Zalecana dawka to 1 tabletkę raz na dobę podczas posiłku. Leczenie powinno trwać przez co najmniej 4-5 tygodni.

Objawowe leczenie w nasileniu dolegliwości związanych z żylakami odbytu: W przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu zalecana dawka wynosi 3 tabletki na dobę przez pierwsze 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni. Leczenie powinno być krótkotrwałe. Jeżeli objawy szybko nie ustępują, należy wykonać badanie proktologiczne i leczenie dostosować do jego wyniku.

Szczególne grupy pacjentów: Brak badań dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Na podstawie dostępnych danych, nie stwierdza się szczególnego ryzyka u pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

Dzieci i młodzież: Brak danych.

Sposób podawania Diosminex Max należy stosować doustnie.

DIOSMINEX, 500 mg, tabletki powlekane, 60 tabletek

Dawkowanie Leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylniej: Zalecana dawka to 2 tabletki na dobę, po jednej tabletkę rano i wieczorem.

Objawowe leczenie w nasileniu dolegliwości związanych z żylakami odbytu - W przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu dawka wynosi 6 tabletek na dobę przez pierwsze 4 dni, a następnie 4 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni.

Sposób podawania Produkt leczniczy Diosminex należy przyjmować doustnie podczas posiłków.

Opakowanie

1000 mg, tabletki powlekane, 30 tabletek, 60 tabletek 500 mg, tabletki powlekane, 60 tabletek

Inne informacje

Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane. Tabletki powlekane są zielone, podłużne, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni, bez plam i uszkodzeń.

Wskazania do stosowania: Leczenie objawów związanych z przewlekłą niewydolnością krążenia żylnego u dorosłych: uczucie ciężkości nóg; ból nóg; nocne kurcze nóg. Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu u dorosłych.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną.

Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska.

1. Ziaja D., Chudek J., Mruszyński M., et al., Skuteczność stosowania preparatu zmikronizowanej diosminy (Diosminexr) w leczeniu przewlekłej niewydolności żylny w populacji polskiej – wyniki wielośrodowiskowego badania obserwacyjnego. „Puls Medyczny” 2012, nr 7 9246), s- 20-21 2. Allert A.F., Beakgaard N., Bouskela E., Caprini J., et al., Management of hronic venous disorders of the lower limbs Guidelines According to Scientific Evidence PART I, Document developed under the auspices of The European Venous Forum The International Union of Angiology The Cardiovascular Disease Educational and Reserch Trust (UK), Union Internationale de PhiEbologie, „International Angiology” 2018, t. 37, nr 3, s. 181-254 3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Diosminex, 500 mg. Tabletki powlekane, 18 lutego 2014r. 4. Charakterystyka Produktu Leczniczego Diosminex Max, 1000 mg, tabletki powlekane, 29.07.2013 r.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

nr Dio-PL-1908-045

Galeria

DIOSMINEX
 Diosminum
 1000 mg
 tabletki powlekane **MAX**

NOWE, ROZSZERZONE WSKAZANIA

- ból nóg
- obrzęk kończyn dolnych
- żyłki kończyn dolnych
- pajęczki naczyniowe i żyły siatkowate
- owrzodzenia żylne

Produkt leczniczy

➔ Leczy objawy przewlekłej niewydolności żyłnej (PNŻ)

06-PL-2204-125

DIOSMINEX
 Diosminum
 1000 mg
 tabletki powlekane **MAX**

Diosminex Max jest wskazany do stosowania we wszystkich stopniach zaawansowania PNŻ (C0-C6 wg klasyfikacji CEAP)*

Brak widocznych zmian	Tętnangiektaza (pajęczki)	Żyłki	Obrzęk	Zmiany troficzne	Wypiętione owrzodzenie	Aktywne owrzodzenie
C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6

*Klasyfikacja klas jest stosowana w celu określenia stopnia zaawansowania przewlekłej niewydolności żyłnej. Klasyfikacja opiera się na widocznych objawach i stopniu zaawansowania choroby żyłnej (C0-C6) w zależności od CEAP.

06-PL-2204-125

DIOSMINEX
 - na ból i obrzęki nóg, pajęczki, żyłki, owrzodzenia żylne

BADANIA KLINICZNE

Terapia lekiem **DIOSMINEX** wiązała się z redukcją obwodu kostki o 0,9cm²¹

Badanie z udziałem polskich pacjentów potwierdziło, że **DIOSMINEX** zmniejsza nasilenie objawów związanych z PNŻ

06-PL-2204-125

DIOSMINEX
 Diosminum
 1000 mg
 tabletki powlekane **MAX**

wspiera aż 9 kluczowych obszarów układu krwionośnego nóg²²

- Zwiększa napięcie żył
- Chroni naczyń
- Zmniejsza rozszerzalność naczyń
- Zmniejsza sztywność żyły
- Zmniejsza przepuszczalność drobnych naczyń
- Zwiększa opór drobnych naczyń
- Zwiększa drenaż limfatyczny
- Przyłącza odpływ krwi żyłnej
- Zwiększa wytrzymałość drobnych naczyń i ich podatność na pękanie

06-PL-2204-125

1 tabletkę dziennie! Opakowanie wystarcza na 2 miesiące stosowania!

DIOSMINEX
 Diosminum
 1000 mg
 tabletki powlekane **MAX**

Produkt leczniczy

06-PL-2204-125