

DIP RILIF żel 50 g



Cena: 11,90 PLN

Opis słownikowy

Producent AXELLUS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Opis

DIP RILIF:

działa szybko i długotrwale lek zalecany w bólach mięśni i stawów,

jedyna na rynku, wyjątkowa kombinacja dwóch substancji czynnych - ulga już po kilku minutach i długotrwałe działanie,

optymalna penetracja do stanu ogniska zapalnego,

wygodna w użyciu postać bezbarwnego żelu.

Działanie

Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, działa silnie przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Zmniejsza stany zapalne w miejscu zmienionym chorobowo, łagodzi ból i zmniejsza obrzęk. Mentol działa miejscowo znieczulająco. Powoduje również miejscowe przekrwienie tkanek. Skojarzone działanie obu składników powoduje uśmierzenie bólu bardzo szybko po naniesieniu żelu na skórę i działanie to utrzymuje się przez wiele godzin.

Zawarty w preparacie Dip Rilif ibuprofen wchłania się przez skórę w ilości odpowiedniej do zapewnienia stężenia leczniczego w stawach. Dzięki zewnętrznemu stosowaniu ibuprofenu nie powoduje on skutków ubocznych charakterystycznych dla doustnego podania. Mentol umożliwia zwiększone przenikanie ibuprofenu do tkanek.

Wskazania

Miejscowe leczenie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Bóle reumatyczne, w tym bóle stawów spowodowane zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi, bóle pleców, lumbago (postrzał), bóle mięśniowe, bóle w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach. Ból i obrzęk wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzji sportowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, u osób z astmą, u których występowały wcześniej napady duszności, wysypka, nieżyt nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Zalecane środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku w przypadku: występowania alergii na leki lub kosmetyki, choroby nerek, jednoczesnego przyjmowania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków, ciąży i karmienia piersią. Nie stosować żelu: na błony śluzowe, wargi, nozdrza i okolice narządów moczowo-płciowych, do oczu i na skórę w okolicach oczu, na skórę uszkodzoną lub zmienioną zapalnie. W przypadku kontaktu z preparatem ww. miejsc należy przepłukać je dużą ilością czystej wody.

Ostrzeżenia specjalne

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Działania niepożądane występują rzadko. Najczęściej są to reakcje miejscowe: zaczerwienienie, świąd, pieczenie, wysypka. Mogą się też pojawić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego - bóle brzucha i niestrawność.

Przechowywanie

Żel w tubach w temperaturze do 25° C.

Dawkowanie i sposób użycia

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: Cienką warstwę żelu nałożyć na bolesne miejsce i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia preparatu. Powtarzać nie częściej niż 3 razy na dobę zachowując co najmniej 4-godzinną przerwę w stosowaniu. Należy jednorazowo stosować 1 do 4 cm żelu.

Skład

Substancje aktywne

Ibuprofen - należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jest substancją działającą silnie przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Zmniejsza stan zapalny w miejscu zmienionym chorobowo, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk, poprawia ruchomość stawów i usuwa uczucie zdrętwienia w stawach. Jego działanie przeciwbólowe występuje po około 30 min i utrzymuje się przez min. 4-6 h.

Mentol - jest alkoholem terpentynowym, który działa miejscowo znieczulająco. Powoduje również miejscowe przekrwienie tkanek, działając drażniąco na receptory ciepłne i zakończenia nerwowe. Zastosowany bezpośrednio na skórę blokuje receptory odpowiedzialne za uczucie bólu. Skojarzone działanie tych dwóch składników powoduje uśmierzanie bólu bardzo szybko po naniesieniu żelu na skórę i działanie to utrzymuje się przez wiele godzin.