OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

DOBENOX FORTE 500 mg 60 tabletek na żylaki na hemoroidy

Cena: 34,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,5 g
Opakowanie	60 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Calcii dobesilas

Opis produktu

WskazaniaDOBENOX FORTE 500 mg 60 tabletekWskazaniażylaki kończyn dolnychżylaki odbytu (hemoroidy)kurcze łydek i nóguczucie ciężkich nóg**Działanie**Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan jednowodny, który usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Zmniejsza przepuszczalność ich ścian oraz nadmierną lepkość krwi i osocza, co zapobiega powstawaniu zastojów i zakrzepów w naczyniach żylnych.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Lek stosuje się doustnie.Lek należy przyjmować po posiłkach.O ile lekarz nie zaleci inaczej, u dorosłych zwykle stosuje się od 1 do 2 tabletek na dobę (co odpowiada dawce dobowej od 500 mg do 1000 mg substancji czynnej - dobezylanu wapnia jednowodnego):niewydolność żylna - zwykle od 1 do 2 tabletek na dobężylaki odbytu - zwykle od 1 do 2 tabletek na dobęW razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Leczenie może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od wskazań**Ważne**Nie należy stosować leku Dobenox lub Dobenox Forte:jeśli pacjent ma uczulenie na wapnia dobezylan jednowodny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku**Skład**Substancja czynną leku jest Wapnia dobezylan jednowodny.1 tabletka zawiera 500 mg Wapnia dobenzylanu jednowodnego.Pozostałe składniki to: Celuloza mikrokrystaliczna, Skrobia ziemniaczana, Laktoza jednowodna, Talk, Magnezu stearynian, Krzemionka koloidalna bezwodna, Otoczka Opadry II 57U18539 White o składzie: Hypromeloza, Polidekstroza, Tytanu dwutlenek (E 171), Talk, Maltodekstryna, Średniołancuchowe trójglicerydy.