

# DOPPELHERZ AKTIV Vital Tonik 1 L



Cena: 25,90 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 l
Postać	płyn
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG
Rodzaj rejestracji	Suplement diety
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Opis Doppelherz Aktiv Vital Tonik, 1000 ml

Produkt jest zalecany dla osób, które powinny szczególnie zadbać o swoje serce, w tym: narażonych na stres, mało aktywnych fizycznie, w sile wieku.

### Zalecane spożycie

Stosować doustnie 3 razy dziennie po 20 ml (2 łyżki stołowe) preparatu po posiłku. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Po otwarciu butelki - przechowywać w lodówce do 2 miesięcy.

### Składniki

woda oczyszczona, substancja zagęszczająca: sorbitol, wyciąg z owoców głogu, wyciąg z liści melisy, koncentrat czerwonego wina, regulator kwasowości: kwas mlekowy, aromat mandarynkowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, kwas L-askorbinowy, cytrynian amonu-żelaza (III), standaryzowany wyciąg ze skórek winogron, amid kwasu nikotynowego, aromat: wanilina, D-pantotienian wapnia, substancja słodząca: acesulfam K, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, substancja słodząca: sacharynian sodu, regulator kwasowości: wodorotlenek sodu, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina.

Zawiera substancje słodzące. Nie zawiera alkoholu. Preparat może być stosowany przez osoby z cukrzycą lub nietolerujące laktozy. Jest odpowiedni dla wegan.

Składniki	w 60 ml
Wyciągi roślinne	
Wyciąg z owoców głogu (5,5:1)	600 mg
Wyciąg z liści melisy (5:1)	600 mg
Koncentrat wina czerwonego (30:1)	600 mg

<b>Składniki</b>	<b>w 60 ml</b>
Wyciągi roślinne	
Standaryzowany wyciąg ze skórek czerwonych winogron (500:1)	30 mg
<b>Witaminy</b>	
Tiamina (wit. B1)	3 mg (273%*)
Ryboflawina (wit. B2)	3 mg (214%*)
Niacyna (wit. B3)	15 mg (94%*)
Kwas pantotenowy (wit. B5)	9,6 mg (160%*)
Witamina B6	3 mg (214%*)
Kwas foliowy (wit. B9)	180 µg (90%*)
Witamina B12	2,1 µg (84%*)
Witamina C	60 mg (75%*)
<b>Składniki mineralne</b>	
Żelazo	10,5 mg (75%*)

\* % RWS - Referencyjne wartości spożycia

#### Ważne

Nie zaleca się stosowania przez dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz przy hemochromatozie (nadmiernym wchłanianiu żelaza). Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami zawierającymi znaczne dawki żelaza, ani z antybiotykami z grupy tetracyklin (np. doksycyklina).