

## DUPHALAC syrop 150 ml



Cena: 8,50 PLN

### Opis słownikowy

Opakowanie	150 ml (but.)
Postać	syrop
Producent	SOLVAY PHARMA SA
Rodzaj rejestracji	Lek

### Opis produktu

#### Opis

Duphalac jest roztworem wodnym stosowanym doustnie. Duphalac jest lekiem przeczyszczającym o działaniu osmotycznym zawierającym laktulozę.

#### Wskazania

Zaparcia: regulacja fizjologicznej czynności okrężnicy.

Przypadki konieczności zmiękczenia stolca ze względów medycznych (żylaki odbytu, po operacjach w obrębie jelita grubego lub odbytu).

Encefalopatia wątrobowa (EW): leczenie i zapobieganie śpiączce wątrobowej lub stanom przedśpiączkowym.

#### Działanie

W okrężnicy laktuloza ulega rozkładowi przez bakterie jelita grubego do kwasów organicznych o niskiej masie cząsteczkowej. Kwasy te powodują obniżenie pH w świetle okrężnicy, a poprzez działanie osmotyczne – wzrost objętości treści okrężnicy. Działania te stymulują perystaltykę okrężnicy i prowadzą do przywrócenia prawidłowej konsystencji stolca. Dochodzi do ustąpienia zaparcia i przywrócenia fizjologicznego rytmu perystaltyki jelita grubego.

U osób z encefalopatią w przebiegu nadciśnienia wrotnego lub w stanie śpiączki wątrobowej czy w stanie przedśpiączkowym działanie leku przypisywano zahamowaniu bakterii proteolitycznych w wyniku wzrostu liczby bakterii acidofilnych (np. pałeczek kwasu

mlekowego), stabilizacji amoniaku w postaci jonowej w wyniku zakwaszenia treści okrężnicy, przeczyszczeniu w wyniku niskiego pH w okrężnicy oraz efektowi osmotycznemu, jak również zmianom metabolizmu azotu bakteryjnego w wyniku stymulacji bakterii do wykorzystywania amoniaku do syntezy białek bakteryjnych. W tym kontekście należy jednak pamiętać o tym, że sama hiperamonemia nie wyjaśnia neuropsychicznych objawów encefalopatii wątrobowej.

Amoniak może jednak stanowić związek modelowy dla innych substancji zawierających azot.

### Sposób użycia

Zaparcia lub przypadki konieczności zmiękczenia stolca ze względów medycznych

Dawka początkowa

Dorośli 15-45 ml

Dzieci (7-14 lat) 15 ml

Dzieci (1-6 lat) 5-10 ml

Niemowlęta 5 ml

Dawka podtrzymująca

Dorośli 15-30 ml

Dzieci (7-14 lat) 10-15 ml

Dzieci (1-6 lat) 5-10 ml

Niemowlęta 5 ml

### Skład

Substancja czynna:

1 ml wodnego roztworu doustnego zawiera 667 g laktulozy na 1000 ml.

Substancje pomocnicze:

Woda oczyszczona.

Duphalac może zawierać niewielkie ilości galaktozy i laktozy.