OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

DUSPATALIN GASTRO 135 mg 15 tabletek

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,135 g
Opakowanie	15 tabl.
Postać	tabl.
Producent	MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Mebeverinum

Opis produktu

WskazaniaDUSPATALIN GASTRO 135 mg 15 tabletekstosowany jest u dorosłych i dzieci powyżej 10 lat w leczeniu objawów bólu brzucha lub dyskomfortu (np. wzdęcia, uczucie rozpierania) w jamie brzusznej, którym mogą towarzyszyć zaburzenia rytmu wypróżnień i zmiany konsystencji stolca, w tym biegunka i (lub) zaparcie spowodowanych nieprawidłową pracą przewodu pokarmowego.**Działanie**Duspatalin Gastro działa rozkurczowo na mięśnie i usuwa ból.Duspatalin Gastro zawiera mebeweryny chlorowodorek. Należy do grupy leków nazywanych spazmolitykami, które działają w jelicie. Jelito jest częścią przewodu pokarmowego. Jego ściany zbudowane są z mięśni. Przez jelito przemieszcza się trawiony pokarm. Jeśli mięśnie jelita mocno się skurczą powoduje to ból. Duspatalin Gastro działa rozkurczowo na mięśnie i usuwa ból.**Sposób użycia**1 tabletka 3 razy dziennie. Lek należy przyjmować 20 minut przed posiłkiem w regularnych odstępach czasu w ciągu dnia.**Ważne**Przeciwwskazania: leku nie należy stosować u dzieci w wieku 10 lat, u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.Przechowywanie: lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 30 stopni Celsjusza.Działania niepożądane: trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, szyi, ust, języka lub gardła. Może to być silna reakcja alergiczna (nadwrażliwość) na lek. Jeśli wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Mogą wystąpić słabsze reakcje alergiczne (nadwrażliwości) na lek np. wysypka, czerwone, swędzące zaczerwienienia na skórze.Ostrzeżenia i środki ostrożności: tabletki należy połykać w całości i popijać odpowiednią ilością wody (przynajmniej 100ml). Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.**Składniki**substancją czynną leku jest chlorowodorek mebeweryny. Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia (kukurydziana lub ziemniaczana), powidon (K25), talk, magnezu stearynian. Otoczka: talk, sacharoza, żelatyna, guma arabska, wosk Carnauba.**Producent**Podmiot odpowiedzialny:Mylan Healthcare Sp. z o.o.,ul. Postępu 21B,02-676 Warszawa.