

LAKCID INTIMA 10 kapsułek dopochwowych (ECOVAG)



Cena: 33,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 kaps.
Postać	kaps.dopochw.twarde
Producent	
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus

Opis produktu

Opis

Przywraca lub utrzymuje prawidłową florę bakteryjną pochwy

10 kapsułek dopochwowych twardych

Można stosować u kobiet w ciąży¹

Lakcid® INTIMA

CHRONI PRZED INFEKCJAMI INTYMNYMI1

1

POWSTRZYMUJE namnażanie patologicznych bakterii i drożdżaków powodujących bakteryjne, grzybicze i mieszane zapalenie pochwy1.

2

REDUKUJE świąd, pieczenie, upławy i nieprzyjemny zapach towarzyszące zapaleniu pochwy.

3

PRZYWRACA prawidłową florę bakteryjną pochwy kobiet.

Bakterie z rodzaju Lactobacillus dzięki swym właściwościom **wpływają na równowagę mikrobiologiczną** ograniczając rozwój

mikroorganizmów chorobotwórczych, ponieważ utrzymują odpowiednie kwaśne pH pochwy².

Konsekwencjami zaburzeń flory bakteryjnej pochwy mogą być nawracające bakteryjne, grzybicze i mieszane (bakteryjne i grzybicze) stany zapalne pochwy².

CZYNNIKI RYZYKA¹

wpływające na równowagę mikrobiologiczną w pochwie² :

stosowanie antybiotyków

stosowanie środków antykoncepcyjnych,

niewłaściwa higiena w trakcie miesiączki

i w trakcie podróży,

stosowanie tamponów,

ciąża, poród,

klimakterium,

stres,

częste korzystanie z basenów, sauny,

intensywne kontakty seksualne,

złe przyzwyczajenia higieniczne, jak np. częste stosowanie irygacji dopochwowych.

Wskazania do stosowania

Lakcid® INTIMA zaleca się stosować w celu utrzymania lub przywrócenia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy.

Jedna kapsułka dopochwowa zawiera:

pałeczki Lactobacillus gasseri DSM 14869 nie mniej niż 108 CFU3

pałeczki Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż 108 CFU3

Zalecane dawkowanie:

DOROŚLI I MŁODZIEŻ W WIEKU 16 LAT I POWYŻEJ

PROFILAKTYCZNIE: Jedna kapsułka na dobę (przed snem) przez 4-6 dni, dopochwowo. U kobiet miesiączkujących - po miesiączce.

PO ANTYBIOTYKOTERAPII: Jedna kapsułka na dobę (przed snem) przez 6-8 dni, dopochwowo.

DZIECI I MŁODZIEŻ

U dziewcząt w wieku od 12 do 16 lat (które rozpoczęły miesiączkowanie) lek można stosować po zaleceniu przez lekarza, w takich samych dawkach jak u dorosłych.

Nie należy stosować leku **Lakcid® INTIMA** w czasie antybiotykoterapii, ponieważ pałeczki Lactobacillus gasseri DSM 14869 i Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 są wrażliwe na antybiotyki. **Jeśli po upływie 8 dni nie nastąpiła poprawa** lub pacjentka czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Pobierz ulotkę

1. ChPL Lakcid Intima 2. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta 3. CFU (ang. Colony Forming Unit) - jednostka

tworząca kolonię **Lakcid Intima można stosować u dziewcząt w wieku 12 do 16 lat (które zaczęły miesiączkowanie) po zaleceniu przez lekarza, w takich samych dawkach jak u dorosłych.

Lakcid Intima. Skład i postać: 1 kapsułka zawiera: pałeczki *Lactobacillus gasseri* DSM 14869 nie mniej niż 108 CFU (ang. Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię), pałeczki *Lactobacillus rhamnosus* DSM 14870 nie mniej niż 108 CFU. Kapsułki dopochwowe, twarde. Biała kapsułka żelatynowa. **Wskazania:** Lakcid Intima zaleca się stosować w celu utrzymania lub przywrócenia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy. **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku Lakcid Intima odpowiednio nr: 14621 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty ChPL: 2020.12.15

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański