

## ELEKTROLITY 7 saszetek o smaku pomarańczowym



Cena: 10,03 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	7 sasz.
Postać	prosz.
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O
Rodzaj rejestracji	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Opis

O produkcie Czy wiesz, że... Sprawdź też Szczegóły produktu

#### O PRODUKCIE

**Elektrolity** są przeznaczone do postępowania w bieguncie i stanach odwodnienia.

Poprzez zmniejszoną osmolarność promują wchłanianie wody ze światła jelit.

Proporcje **soli mineralnych** uzupełnionych **glukozą** sprawiają, że transport wody do komórek jest bardziej efektywny.

**Elektrolity** są dostępne w formie proszku do rozpuszczania w wodzie o smaku truskawkowym i pomarańczowym.

CZY WIESZ, ŻE...

Objawami stanów odwodnienia mogą być:

- **suchość w ustach**
- **brak oddawania moczu**
- **silne pragnienie.**

Dzięki **Elektrolitom** rekomendowanym przez **Stoperan** więcej wody przechodzi do tkanek. Tym samym stosowanie ich w trakcie biegunki zmniejsza ryzyko odwodnienia.

Elektrolity rekomendowane przez **Stoperan** mogą być stosowane przez:

dzieci od 3 roku życia

dorosłych

osoby w podeszłym wieku

Elektrolity rekomendowane przez **Stoperan** są zalecane do postępowania dietetycznego w **bieguncie**, której może towarzyszyć stan

## odwodnienia.

**Ostrożność powinni zachować:** • chorzy z **cukrzycą** (z uwagi na zawartość glukozy) • chorzy leczący **nadciśnienie spirolonaktonem** lub **inhibitorami AC** (z uwagi na zawartość sodu i potasu)

Elektrolity należy podawać od pierwszej chwili wystąpienia biegunki (a także wymiotów).

**Dawkowanie** Zawartość 1 saszetki należy rozpuścić w 200ml wody i podawać małymi porcjami.

Płynu **nie należy** dodatkowo dosładzać.

ZAWSZE STOSUJ ELEKTROLITY PRZY BIEGUNCE

SPRAWDŹ TEŻ

\*

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Skład

Działanie

Wskazania

Przeciwwskazania

## Dawkowanie i sposób użycia

(1 saszetka): glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52 g, chlorek potasu 0,3 g, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat pomarańczowy, substancja słodząca: acesulfam K, sukraloza. (1 saszetka): glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52 g, chlorek potasu 0,3 g, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat truskawkowy, substancja słodząca: acesulfam K, sukraloza.

Elektrolity rekomendowane przez Stoperan dostarczają organizmowi niezbędnych składników do nawodnienia.

Do postępowania dietetycznego w biegunce, w którym: uzupełnia elektrolity utracone podczas biegunki.

Wstrząs hemodynamiczny. Niedrożność jelit. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do żywienia pozajelitowego.

Każdą saszetkę rozpuścić w 200ml wody. Nawodnienie prowadzić przez 3-4 godziny, podczas których zastosować: 1000ml przygotowanego płynu (5 saszetek) u dzieci do 15kg masy ciała; 1400ml przygotowanego płynu (7 saszetek) u dzieci powyżej 15 kg masy ciała i osób dorosłych. Płyn należy podawać małymi porcjami, a w przypadku wymiotów wręcz łyżeczką. Po tym czasie podawać płyn w ilości 1000ml po każdym luźnym wypróżnieniu lub wymiotach. Płynu nie należy dosładzać.

\*Stoperan, 2 mg, kapsułki twarde. Postać: kapsułki twarde Wskazania: Stoperan jest wskazany w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych, dzieci w wieku powyżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

**Właściwości** ELEKTROLITY 7 saszetek o smaku pomarańczowym Elektrolity rekomendowane przez Stoperan zalecane są do postępowania dietetycznego w biegunce i stanach odwodnienia, by efektywnie nawodnić organizm i przywrócić równowagę wodno-elektrolitową; mają skład zgodny z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), obniżona osmolarność produktu do 245 mOsm/l wspomaga przenikanie elektrolitów i wody przez ścianę jelita, dostarczają energii Produkt może być stosowany przez: osoby z biegunką infekcyjną, w tym wirusową (np. tzw. grypę żołądkową lub jelitową) cierpiące na biegunki przewlekłe, kobiety w ciąży i matki karmiące, dzieci powyżej 3. roku życia i osoby dorosłe osoby starsze. Produkt musi być stosowany pod nadzorem lekarza **Sposób użycia** Każdą saszetkę rozpuścić w 200 ml wody. Nawodnienie prowadzić przez 3–4 godziny, podczas których zastosować: 1000 ml przygotowanego płynu (5 saszetek) u dzieci do 15 kg masy ciała; 1400 ml przygotowanego płynu (7 saszetek) u dzieci powyżej 15 kg masy ciała i osób dorosłych. Płyn należy podawać małymi porcjami, a w przypadku wymiotów wręcz łyżeczką. Po tym czasie podawać płyn w ilości 100 ml po każdym luźnym wypróżnieniu lub wymiotach. Płynu nie należy dosładzać. **Ważne** Ostrzeżenia: Produkt zawiera glukozę – chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność. Produkt zawiera sód i potas – osoby leczone z powodu nadciśnienia (spironolaktonem lub inhibitorami ACE) powinny zachować ostrożność. Nie stosować przy: wstrząsie hemodynamicznym, niedrożności jelit, nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. **Składniki** glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52 g, chlorek potasu 0,3 g, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat pomarańczowy, substancja słodząca: acesulfam K, sukraloza. Produkt zawiera cukier i substancje słodzące. **Producent** USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa,

Galeria

Stoperan rekomenduje  
**Elektrolity**  
 Osmolarność 245 mOsm/l

**W BIEGUNCE I STANACH ODWODNIENIA:**

- nawadnia podczas biegunki
- uzupełnia straty elektrolitów
- dostarcza energii




**SPOSÓB PRZYGOTOWANIA**




Zawartość 1 saszetki należy rozpuścić w 200 ml wody

Stoperan rekomenduje  
**Elektrolity**

MOGĄ BYĆ STOSOWANE W:

  
 biegunce

  
 stanach odwodnienia

Skład zgodny z rekomendacją WHO<sup>1</sup>



Zywność specjalnego przeznaczenia medycznego

**NA ODWODNIENIE W BIEGUNCE**

1. WHO, WHO Weekly Report, 1982, 87(12), 383-384. 2. WHO Weekly Report, 1982, 87(12), 383-384. 3. WHO Weekly Report, 1982, 87(12), 383-384.

**DOBRY SMAK**

Pomarańcza



Truskawka

Zywność specjalnego przeznaczenia medycznego

**SKŁAD**

Skład 1 saszetki: glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52 g, chlorek potasu 0,3 g, aromat truskawkowy, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, substancje słodzące: acesulfam K, aspartam. Produkt Elektrolity smak truskawkowy zawiera cukier i substancje słodzące.

Wartość odżywcza/składniki produktu	w 100 ml płynu	w 200 ml płynu (1 saszetka)
Wartość energetyczna	24 kJ/6 kcal	48 kJ/12 kcal
Tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe nasycone	0 g	0 g
Węglowodany	1,4 g	2,8 g
- w tym cukry	1,4 g	2,8 g
Białko	0 g	0 g
Sól	0,26 g	0,52 g
Sód	170 mg	340 mg
Potas	79 mg	158 mg
Chlorek	229 mg	458 mg
Cytrynian	186 mg	372 mg