


## ENTEROL 250mg Lek probiotyczny, 20 kapsułek (INPHARM)

Cena: 39,90 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	250 mg
Opakowanie	20 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Saccharomyces boulardii CNCM I-745

### Opis produktu

#### Wskazania

##### Lek z importu równoległego.

**Lek Enterol jest stosowany w:**- leczeniu ostrych biegunek infekcyjnych- zapobieganiu biegunkom poantybiotykowym- nawracającej biegunce spowodowanej zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia- wankomycyną lub metronidazolem- zapobieganiu biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym- zapobieganiu biegunkom podróżnych- wspomagająco w leczeniu biegunek występujących w zespole jelita drażliwego (IBS).

#### Działanie

Enterol jest doustnym lekiem przeciwbiegunkowym, którego substancją czynną są liofilizowane drożdżaki Saccharomyces boulardii, zaliczane są do probiotyków, czyli żywych mikroorganizmów, które przynoszą korzyści zdrowotne dla organizmu gospodarza.

#### Sposób użycia

**Zalecane dawkowanie u dorosłych i dzieci**ostra biegunka infekcyjna: 1 do 2 kapsułek na dobę, przez okres do 1 tygodnia biegunka poantybiotykowa: 1 do 2 kapsułek na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii biegunka spowodowana zakażeniem C. difficile: 4 kapsułki na dobę, przez okres do 4 tygodni biegunka związana z żywieniem dojelitowym: 1 do 2 kapsułek na dobę biegunka podróżnych: 1 do 4 kapsułek na dobę przez okres do 1 tygodnia wspomagająco w leczeniu biegunek występujących w zespole jelita drażliwego (IBS): 1 kapsułka 1 do 2 razy na dobę. Leczenie biegunki należy kontynuować przez kilka dni po ustąpieniu objawów. **Sposób podawania** Stosować doustnie. Kapsułkę należy połknąć popijając szklanką wody. Kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość wsypać do niewielkiej ilości osłodzonego napoju, pokarmu lub dodać do butelki z pokarmem dla dziecka. U dzieci w wieku poniżej 6 lat nie jest wskazane stosowanie kapsułek ze względu na możliwość zadławienia; zaleca się otwieranie kapsułek i dodawanie ich zawartości do napoju lub pokarmu. **Pominięcie przyjęcia leku Enterol** Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## Ważne

**Kiedy nie stosować leku Enterol:**- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)- jeśli pacjent ma założone wkłucie do żyły centralnej (patrz punkt Ostrzeżenia i środki ostrożności)- pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością lub hospitalizowani (z powodu ciężkich chorób lub zaburzeń (osłabienia) układu odpornościowego)**Ostrzeżenia i środki ostrożności**Przed rozpoczęciem stosowania leku Enterol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.Nie zaleca się otwierania kapsułek w pobliżu pacjentów z cewnikiem założonym do żyły centralnej, aby zapobiec niepożądanego kolonizacji grzybów na cewnik, zwłaszcza przeniesieniu przez zanieczyszczone ręce. Istnieją doniesienia o bardzo rzadkich przypadkach fungemii (penetracji grzybów do krwi) z towarzyszącą gorączką i dodatnim wynikiem posiewu z krwi, nawet u pacjentów nie leczonych *Saccharomyces boulardii*. We wszystkich opisanych przypadkach fungemia ustąpiła po zastosowaniu leczenia przeciwgrzybiczego lub, gdy było to konieczne, po usunięciu cewnika z żyły centralnej.**Jako uzupełnienie leczenia zaleca się:**- odpowiednie nawodnienie organizmu (rehydratację) poprzez spożywanie dużych ilości słonych lub słodkich napojów, w celu wyrównania strat płynów spowodowanych biegunką (średnie dzienne zapotrzebowanie osoby dorosłej na wodę wynosi 2 litry)- utrzymanie odpowiedniego reżimu żywieniowego wykluczając niektóre pokarmy, takie jak: owoce, zielone warzywa, pikantne potrawy, mrożona żywność, schłodzone napoje; natomiast zaleca się spożywanie grillowanego mięsa i ryżu; należy rozważyć ograniczenie spożywania mleka i pokarmów mlecznych.**Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza w przypadku:**- braku poprawy po 2 dniach leczenia- gorączki, wymiotów- pojawienia się krwi lub śluzu w stolcu- uczucia wzmożonego pragnienia, suchości języka: to objawy rozpoczynającego się odwodnienia, to znaczy utraty znacznej ilości płynów w wyniku biegunki. Należy skontaktować się z lekarzem, który zdecyduje o konieczności rehydratacji doustnej lub dożylniej.**Lek Enterol a inne leki**Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceutce o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.Nie należy stosować leku Enterol jednocześnie z doustnymi lekami przeciwgrzybiczymi (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych).**Lek Enterol z jedzeniem, pić i alkoholem**Lek Enterol zawiera żywe komórki. Z tego powodu nie należy mieszać go ze zbyt gorącymi (ponad 50°C) lub zimnymi płynami, potrawami i alkoholem, ponieważ mogłyby to zniszczyć komórki drożdży.**Ciąża i karmienie piersią**Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży.*Saccharomyces boulardii* nie wchłania się do mleka matki. Ze względu na brak danych, zaleca się rozważenie stosunku korzyści do ryzyka przed zastosowaniem leku Enterol w okresie karmienia piersią.**Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**Lek nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.**Lek Enterol zawiera laktozę jednowodną**Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

## Składniki

- Substancją czynną leku są liofilizowane drożdżaki *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745, jedna kapsułka twarda zawiera 250 mg drożdżaków.- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, magnezu stearynian; osłonka: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171).

## Podmiot odpowiedzialny

**Podmiot odpowiedzialny w Grecji, kraju eksportu:**Petsiavas A.E.Ag. Anargyron 21145 64 K. KifissiaGrecjaWytwórca:BIOCODEX1 avenue Blaise Pascal60000 BEAUVAISFrancjaImporter równoległy:InPharm Sp. z o.o.ul. Strumykowa 28/1103-138 WarszawaPrzepakowano w:InPharm Sp. z o.o. Services sp. k.ul. Chełmżyńska 24904-458 WarszawaNumer pozwolenia w Grecji, kraju eksportu: 67617/22-6-201854567/23-06-2021Numer pozwolenia na import równoległy: 15/24