

ERDOMED MUKO 225 mg proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 10 saszetek



Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Dawka | 0,225 g |
| Opakowanie | 10 sasz. |
| Postać | prosz. do sp. zaw. doust. |
| Producent | ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O |
| Rodzaj rejestracji | Lek |
| Substancja czynna | Erdosteinum |

Opis produktu

Opis

Na kaszel mokry? Na zatłkane zatoki? Erdomed Muko.

Jak działa ERDOSTEINA? Kiedy stosować ERDOMED MUKO? Bezpieczny dla żołądka Dawkowanie Co wyróżnia ERDOMED MUKO? Szczegóły produktu

zawiera ERDOSTEINĘ - najnowszą substancję leczniczą¹ o szerokim spektrum działania:

lek OTC

1 IQVIA, Dataview, R05C, 2020

Zmniejsza gęstość i lepkość wydzieliny, ułatwia jej usuwanie z dróg oddechowych.

Zmniejsza częstość i natężenie uporczywego kaszlu.

Zmniejsza przyleganie bakterii do nabłonka dróg oddechowych, dzięki czemu **minimalizuje ryzyko rozwoju infekcji bakteryjnej.**

Działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie.

Zwiększa stężenie antybiotyku w wydzielinie, co **poprawia efektywność antybiotykoterapii.**

Kiedy zastosować ?

Lek jest stosowany w celu **rozrzedzenia i ułatwienia wykrztuszania śluzowej wydzieliny** z dróg oddechowych.

2ChLP Erdomed Muko

jest **BEZPIECZNY DLA ŻOŁĄDKA**.

Erdosteina to **PROLEK**, który w formie nieaktywnej przechodzi przez przewód pokarmowy. Dzięki temu **nie wywiera wpływu na błonę śluzową żołądka**.

Może być **bezpiecznie stosowany u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy**.

3Kupaj A., Fornal R., Kurzawa R., Zastosowanie erdosteiny w codziennej praktyce lekarskiej, Świat Medycyny i Farmacji, 2019, 12, 18-24

Dawkowanie

Dorośli 1 saszetka 2-3 x na dobę

Dzieci > 12 r.ż. 1 saszetka 2 x na dobę

Leku nie należy stosować przed snem ze względu na utrudnione odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny podczas snu.

Jak przygotować?

Zawartość saszetki rozpuścić w pół szklanki (120 ml) wody o temperaturze pokojowej. Podanie doustne.

Co wyróżnia ?

Najnowsza substancja lecznicza o szerokim spektrum działania. **Ułatwia odkrztuszenie** zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych. **Minimalizuje ryzyko rozwoju infekcji bakteryjnej**. **Zmniejsza** częstość i natężenie **uporczywego kaszlu**. **Bezpieczny dla żołądka**, podawany w formie nieaktywnego proleku. **Przyjazna dla dzieci (od 12 r.ż.) i dorosłych** postać pomarańczowego płynu, który dodatkowo **nawadnia organizm**.

1 IQVIA, Dataview, R05C, 2020

dostępny w dwóch wariantach opakowania

lek OTC

1 opakowanie wystarcza na 1 pełną terapię

lek OTC

Sprawdź dostępność

Szczegóły produktu

Skład

Wskazania

Stosowanie

Przechowywanie

Inne informacje

Skład

Substancją czynną leku jest erdosteina. Jedna saszетка zawiera 225 mg erdosteiny. Pozostałe składniki to: sacharoza, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemu dwutlenek, sukraloza (E 955), kwas jabłkowy bezwodny, aromat pomarańczowy [maltodekstryna kukurydziana, substancje aromatyzujące (w tym, między innymi cytral, alkohol benzylowy, linalol), α -tokoferol (E 307)].

Postać farmaceutyczna: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Lek Erdomed Muko dostępny w dwóch wielkościach opakowania: 10 i 20 saszetek.

Wskazania

Erdomed Muko zawiera substancję czynną erdosteinę, która należy do grupy leków mukolitycznych, zmniejszających lepkość śluzu w drogach oddechowych i ułatwiających jego wykrztuszenie.

Erdomed Muko jest stosowany w celu rozrzedzenia i ułatwienia wykrztuszenia śluzowej wydzieliny z dróg oddechowych, jako lek wspomagający w leczeniu ostrych i przewlekłych schorzeń dróg oddechowych, takich jak stany zapalne nosa, zatok, krtani, tchawicy, oskrzeli oraz płuc.

Stosowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Stosowanie u dzieci od 12. roku życia: 1 saszетка 2 razy na dobę.

Stosowanie u dorosłych: 1 saszетка 2 lub 3 razy na dobę.

Nie jest wymagane korygowanie dawek u dorosłych w przypadku zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Stosowanie leku Erdomed Muko u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek: Nie jest wymagane korygowanie dawek u dorosłych w przypadku umiarkowanej niewydolności nerek (klirens kreatyniny >25 ml/min).

Stosowanie leku Erdomed Muko u pacjentów w podeszłym wieku: Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Sposób użycia

Zawartość saszetki wsypać do ok. 120 ml (pół standardowej szklanki) wody o temperaturze pokojowej, w razie potrzeby zamieszać do uzyskania rzadkiej, mętnej zawiesiny. Stosować doustnie, bezpośrednio po przygotowaniu, według powyższego schematu dawkowania.

Leku nie należy stosować przed snem ze względu na utrudnione odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny podczas snu.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Inne informacje

Kiedy nie stosować leku Erdomed Muko:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), albo na substancje zawierające wolne grupy SH (np.: acetylocysteinę); jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby; jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek (klirens kreatyniny)

Galeria

ERDOMED[®]MUKO
 zawiera **erdosteinę - najnowszą substancję leczniczą***
 o szerokim spektrum działania:

- Ułatwia usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych
- Zmniejsza intensywność kaszlu
- Minimalizuje ryzyko rozwoju infekcji bakteryjnej
- Działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie

TERAZ BEZ RECEPTY

*EMA, Działanie, RDC, 2020. EN45/1/21

Kiedy stosować **ERDOMED[®]MUKO**
Leczenie wspomagające w:

- w ostrych infekcjach górnych dróg oddechowych: nosa, zatok przynosowych, krtani z nadmiernym wydzielaniem śluzu.
- w ostrych infekcjach dolnych dróg oddechowych: tchawicy, oskrzeli, płuc z nadmiernym wydzielaniem śluzu.
- w przewlekłych infekcjach górnych i dolnych dróg oddechowych z nadmiernym wydzielaniem śluzu.

*ChP, Erdomed Muko. EN45/1/21

Dawkowanie **ERDOMED[®]MUKO**

- Dorośli**
1 saszетка 2-3 x na dobę
- Dzieci > 12 r.ż.**
1 saszетка 2 x na dobę

Jak przygotować Erdomed Muko?
 Zawartość saszетки rozpuścić w pół szklanki (120 ml) wody o temperaturze pokojowej.

lek OTC. EN45/1/21

Erdosteina to **PROLEK**, który nie wywiera wpływu na błonę śluzową żołądka.

BEZPIECZNY DLA ŻOŁĄDKA
 Może być bezpiecznie stosowany u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.

*Kupaj A, Fornal B, Kuratowa B. Zastosowanie erdosteiny w codziennej praktyce lekarskiej. Świat Medycyny i Farmacji. 2019; 12: 56-57. EN45/1/21

10 saszettek
1 opakowanie wystarczy na 1 pełną terapię

ERDOMED[®]MUKO
 10 saszettek

lek OTC. EN45/1/21

ERDOMED[®]MUKO
 dostępny w dwóch wariantach opakowania

10 saszettek
20 saszettek

ERDOMED[®]MUKO
 10 saszettek
ERDOMED[®]MUKO
 20 saszettek

lek OTC. EN45/1/21