

## FENISTIL krople doustne 20 ml INPHARM uczulenie, alerggia



Cena: 18,95 PLN

### Opis słownikowy

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Dawka              | 1 mg/ml             |
| Opakowanie         | 1 but.a 20ml        |
| Postać             | krop.doust., roztw. |
| Producent          | INPHARM SP. Z O.O.  |
| Rodzaj rejestracji | Lek                 |
| Substancja czynna  | Dimetindenum        |

### Opis produktu

**Opis FENISTIL krople doustne 20 ml INPHARM** Fenistil należy do grupy leków przeciwhistaminowych. Hamuje działanie histaminy - substancji odpowiedzialnej za reakcje alergiczne. Łagodzi świąd i podrażnienie spowodowane wysypką skórą, zmniejsza obrzęk, a także łagodzi objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takie jak wodnista wydzielina z nosa (katar), kichanie, świąd nosa oraz swędzenie i łzawienie oczu. Po podaniu doustnym, działanie leku rozpoczyna się po 30-60 minutach i utrzymuje się przez 8 do 12 godzin. Lek stosowany jest w leczeniu objawowym alergii pokarmowych oraz polekowych, jak również: łagodzi świąd towarzyszący chorobom zakaźnym (np. ospie). Może być stosowany w celu łagodzenia objawów występujących po ukąszeniu owadów oraz w zapobieganiu reakcjom alergicznym występującym podczas leczenia odczulającego. Fenistil stosuje się do leczenia objawów chorób alergicznych: skóry: pokrzywka, świąd w przebiegu atopowego zapalenia skóry, alergicznego wyprysku kontaktowego, wyprysku endogennego, układu oddechowego: sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (katar sienny) i przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (np. uczulenie na kurz domowy, sierść zwierząt, pierze). **Sposób użycia** Lek Fenistil należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zazwyczaj stosowana dawka leku Fenistil to: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Dawka dobową wynosi 3-6 mg dimetyndenu podawane w 3 równych dawkach podzielonych. Zaleca się stosowanie po 20 do 40 kropli 3 razy dobowo. U pacjentów ze skłonnością do senności należy stosować 40 kropli przed snem i 20 kropli rano, podczas śniadania. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: Niemowlęta od 1. miesiąca do ukończenia 1. roku życia (tylko na zalecenie lekarza): 3-10 kropli trzy razy na dobę. Dzieci w wieku 1 do 3 lat: 10-15 kropli trzy razy na dobę. Dzieci w wieku 3 do 12 lat: 15 - 20 kropli trzy razy na dobę. Leku Fenistil nie należy poddawać działaniu wysokiej temperatury. Jeżeli niemowlę jest karmione butelką, lek dodawać do butelki z ciepłym pokarmem bezpośrednio przed karmieniem. Jeżeli niemowlę jest karmione łyżeczką, krople można dodawać nierozcieńczone, na małej łyżeczce do herbaty. W przypadku pominięcia dawki leku, należy zastosować ją tak szybko, jak to możliwe, o ile do zastosowania kolejnej dawki nie pozostało mniej niż 2 godziny. **Ważne** Przeciwwskazania: Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na dimetyndenu maleinian lub którykolwiek z pozostałych składników leku Fenistil. U noworodków do ukończenia pierwszego miesiąca życia, zwłaszcza przedwcześnie urodzonych. Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią. Bez zalecenia lekarza nie należy podawać kropli Fenistil dzieciom od 1 miesiąca do ukończenia 1. roku życia. Lek nasila działanie alkoholu. Dlatego podczas stosowania leku Fenistil nie należy pić alkoholu. **Skład** Substancją czynną leku jest dimetyndenu maleinian. Jeden mililitr leku Fenistil zawiera 1 mg dimetyndenu maleinianu. Inne składniki leku to glikol propylenowy (E 520), kwas benzoesowy (E 210), disodu edetynian, disodu wodorofosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa, woda oczyszczona. **Producent** Importer: InPharmKraj: Holandia Producent: INPHARM/NOVARTIS CONSUMER Genewska 6A Warszawa