

FERVEX 12 saszetek leczy objawy przeziębienia i grypy



Cena: 24,10 PLN

Opis słownikowy

Producent UPSA LABORATOIRES

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Wskazania FERVEX, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 12 saszetek Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat. **Działanie** Fervex jest lekiem złożonym. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Maleinian feniraminy zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, przez co udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu. Kwas askorbowy uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie. Lek wskazany do stosowania powyżej 15 roku życia. **Sposób użycia** **Dawkowanie:** Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat: 1 saszетка 2 lub 3 razy na dobę. Przerwy w podawaniu kolejnych dawek powinny wynosić co najmniej 4 godziny. W przypadku zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), należy zachować co najmniej 8 godzinne przerwy pomiędzy dawkami. Zawartość saszетки należy rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 5 dni bez porozumienia z lekarzem. W leczeniu stanów grypopodobnych lepiej jest przyjmować lek rozpuszczony w gorącej wodzie, wieczorem, jak najszybciej od wystąpienia objawów. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek, jaskra z wąskim kątem, rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu, dzieci poniżej 15 lat, pacjenci z nietolerancją fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy (zawiera sacharozę). **Ważne Ostrzeżenia i środki ostrożności:** Ryzyko wystąpienia uzależnienia psychicznego przy stosowaniu dawek większych niż zalecane i długotrwałym leczeniu, aby uniknąć przedawkowania, należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu (u osób dorosłych o masie ciała powyżej 50 kg, całkowita dawka dobową paracetamolu nie może być większa niż 4 g/dobę). Picie napojów alkoholowych lub przyjmowanie środków uspokajających (zwłaszcza barbituranów) nasila działanie uspokajające leków przeciwhistaminowych, dlatego należy unikać jednoczesnego ich przyjmowania. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (G-6-PD). Może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu. Podmiot odpowiedzialny: UPSA SAS, Francja Dystrybutor: MagnaPharm Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa **Skład** **Jedna saszетка zawiera:** paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg

Galeria



FERVEX

Jeden lek zwalczający **AZ 7 objawów** przeziębienia i grypy

- GORĄCZKA
- BÓL GARDŁA
- KATAR
- BÓL GŁOWY
- BÓL MIĘŚNI
- KICHANIE
- ŁZAWIENIE

FERVEX

- rozgrzewający napój* o przyjemnym cytrynowym smaku
- witamina C w dawce 200 mg

Fervex to moc 3 składników
paracetamol 500 mg
kwas askorbowy 200 mg
mefenamicen 25 mg

Dawkowanie:
Dorośli i dzieci powyżej 15 lat: 1 szaszetka 2 lub 3 razy na dobę.
Przeny w podaniu dawkę powinny wynosić co najmniej 4 godziny.
Nie należy stosować dłużej niż 5 dni bez porozumienia z lekarzem.

