

FERVEX D 8 saszetek BEZ CUKRU



Cena: 19,22 PLN

Opis słownikowy

Producent UPSA LABORATOIRES

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Wskazania FERVEX D, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 8 saszetek Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat; może być stosowany przez chorych na cukrzycę **Działanie** Fervex D jest lekiem złożonym. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Maleinian feniraminy zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, przez co udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu. Kwas askorbowy uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie. Lek wskazany do stosowania powyżej 15 roku życia. Nie zawiera cukru. **Sposób użycia** Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat: 1 saszетка 2 lub 3 razy na dobę. Przerwy w podawaniu kolejnych dawek powinny wynosić co najmniej 4 godziny. W przypadku zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), należy zachować co najmniej 8 godzinne przerwy pomiędzy dawkami. Zawartość saszетки należy rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 5 dni bez porozumienia z lekarzem. **Ważne** Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; ciężka niewydolność wątroby lub nerek, jaskra z wąskim kątem, rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu, dzieci poniżej 15 lat; fenylketonuria (zawiera aspartam). Ryzyko uzależnienia psychicznego przy stosowaniu dawek większych niż zalecane i długotrwałym leczeniu, aby uniknąć przedawkowania, należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu. U osób dorosłych o masie ciała powyżej 50 kg, całkowita dawka dobową paracetamolu nie może być większa niż 4 gramy na dobę. Picie napojów alkoholowych lub przyjmowanie środków uspokajających (zwłaszcza barbituranów) nasila działanie uspokajające leków przeciwhistaminowych, dlatego należy unikać jednoczesnego ich przyjmowania. Istnieje ryzyko uszkodzenia wątroby u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol. Ostrożnie stosować u pacjentów z niedoborem G6PD. Może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu. Podmiot odpowiedzialny: UPSA SAS, Francja Dystrybutor: MagnaPharm Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa **Skład** Jedna saszетка zawiera: paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg

Galeria



FERVEK D

Jeden lek zwalczający **AŻ 7 objawów** przeziębienia i grypy

- GORĄCZKA
- BÓL GARDŁA
- KATAR
- BÓL GŁOWY
- BÓL MIĘŚNI
- KICHANIE
- ŁZAWIENIE

FERVEK D

- rozgrzewający napój* o przyjemnym smaku
- witamina C w dawce 200 mg

Fervek D to moc 3 składników:
paracetamol 500 mg
kwas askorbowy 200 mg
mudriolan feniraminy 25 mg

BEZ CUKRU

Dawkowanie:
Dorośli (dzieci powyżej 15 lat): 1 saszetka 2 lub 3 razy na dobę.
Przebieg w podanej dawce powinien wytrwać co najmniej 4 godziny.
Nie należy stosować dłużej niż 5 dni bez porozumienia z lekarzem.

