

FORLAX proszek do sporządzania roztworu 20 saszetek zaparcia

Cena: 19,15 PLN



Opis słownikowy

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

WskazaniaFORLAX proszek do sporządzania roztworu 20 saszetek Forlax 10 g jest stosowany w objawowym leczeniu zaparcć u dorosłych i u dzieci w wieku od 8 lat.**Działanie**Lek ma postać proszku, który należy rozpuścić w szklance wody (co najmniej 50 ml) i wypić. Aby lek zadziałał potrzeba zwykle 24 do 48 godzin.Leczenie zaparcia za pomocą leków powinno stanowić jedynie uzupełnienie zdrowego stylu życia i diety.Forlax 10 g zawiera makrogol 4000 jako substancję czynną i należy do grupy leków zwanych lekami przeczyszczającymi o działaniu osmotycznym. Działa poprzez zwiększenie ilości wody w stolcu, co pomaga przezwyciężyć problemy związane ze zbyt wolną pracą jelit. Forlax 10 g nie wchłania się do krwiobiegu i nie ulega rozkładowi w organizmie.**Sposób użycia**Forlax 10 g należy zawsze przyjmować zgodnie z tą ulotką lub z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.Stosowanie u dzieci powyżej 8 lat i dorosłychRekomendowana dawka to jedna - dwie saszetki na dobę, przyjmowane najlepiej w postaci jednej dawki rano.Dawka dobową zależy od uzyskanego efektu i wynosi od jednej saszetki co drugi dzień (szczególnie u dzieci) do maksymalnie dwóch saszetek na dobę.Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody (co najmniej 50 ml) bezpośrednio przed spożyciem, następnie wypić przygotowany roztwór.Uwaga:Działanie leku Forlax 10 g pojawia się w ciągu 24-48 godzin po podaniu.U dzieci okres stosowania leku Forlax 10 g nie powinien przekraczać 3 miesięcy.Poprawa perystaltyki uzyskana po stosowaniu leku Forlax 10 g może być utrzymana pod warunkiem przestrzegania zdrowego trybu życia oraz zaleceń dietetycznych.Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, gdy dojdzie do nasilenia objawów lub w przypadku braku poprawy.**Ważne**Kiedy nie przyjmować leku Forlax 10 g jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na makrogol (glikol polietylenowy) lub którykolwiek z pozostałych składników (wymienionych w punkcie 6).jeśli u pacjenta występuje choroba taka jak ciężka choroba jelit:choroba zapalna jelit (taka, jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, Choroba Leśniowskiego-Crohna, nieprawidłowe zwężenie jelit)perforacja jelit lub ryzyko wystąpienia perforacji jelitnieδροżność jelit lub podejrzenie niedrożności jelitból brzucha o nieznanym przyczynie**Skład**Substancją czynną leku jest makrogol 4000 – 10,00 g w każdej saszetce.Ponadto lek zawiera:sacharynę sodową (E954), aromat pomarańczowo-grejpfrutowy olejki: pomarańczowy i grejpfrutowy, skoncentrowany sok pomarańczowy, cytral, aldehyd octowy, linalol, etylu maślan, alfa-terpineol, oktanal, beta-gamma-heksenol, maltodekstryna, guma arabska, sorbitol, butylowany hydroksyanizol (E320) oraz dwutlenek siarki (E220)