

FUNGOTAC 0,01g/ml krople do uszu 20 ml

Cena: 42,50 PLN



Opis słownikowy

Dawka	10 mg/ml
Opakowanie	20 ml (but.)
Postać	krop.do uszu, roztw.
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Clotrimazol

Opis produktu

WskazaniaGrzybicze zakażenia ucha zewnętrznego i środkowego wywołane działaniem drożdży (z rodzaju Candida), pleśni (z rodzaju Aspergillus) oraz innych grzybów.W przypadku wątpliwości czy występujące u pacjenta objawy wskazują na zakażenie grzybicze ucha, należy zwrócić się do lekarza.**Działanie**Lek Fungotac ma postać kropli, roztworu do uszu. Substancją czynną leku Fungotac jest klotrymazol, należący do leków z grupy imidazoli. Fungotac ma działanie przeciwgrzybicze, zwalcza przyczynę zakażeń grzybiczych uszu.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego do ucha.W przypadku zakażenia grzybiczego ucha, należy stosować do wnętrza ucha 2 lub 3 krople leku Fungotac od dwóch do trzech razy na dobę.Po ustąpieniu ostrych objawów choroby, leczenie należy kontynuować jeszcze przez co najmniej 2 tygodnie, aż do całkowitego ustąpienia dolegliwości.Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku FungotacBrak doniesień o przypadkach przedawkowania klotrymazolu stosowanego miejscowo.W razie połknięcia leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Pominięcie zastosowania leku FungotacJeżeli dawka leku zostanie pominięta, należy przyjąć ją jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym.Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.**Ważne**Kiedy nie stosować leku FungotacJeśli pacjent ma uczulenie na klotrymazol lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).Ostrzeżenia i środki ostrożnościPrzed rozpoczęciem stosowania leku Fungotac należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą lub pielęgniarką.Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego do ucha.Chronić oczy przed kontaktem z lekiem.Fungotac a inne lekiNależy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.Brak danych.Lek Fungotac a Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodnośćJeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.CiążaW czasie ciąży stosowanie leku jest możliwe wyłącznie na zlecenie i pod nadzorem lekarza.Karmienie piersiąU kobiet karmiących piersią stosowanie leku jest możliwe tylko na zlecenie i pod nadzorem lekarza.Wpływ na płodnośćNie prowadzono badań dotyczących wpływu stosowania klotrymazolu na płodność u ludzi, jednak badania na zwierzętach nie wykazały wpływu klotrymazolu na płodność.Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszynLek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.**Skład**Substancją czynną leku jest klotrymazol. 1 ml roztworu zawiera 10 mg klotrymazolu.Pozostałe składniki to: makrogl 400; kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH do 4,5-7,0), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH do 4,5-7,0).