

FURAGINUM HASCO MAX 100 mg 30 tabletek na drogi moczowe



Cena: 9,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,1 g
Opakowanie	30 tabl.
Postać	tabl.
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Furazidinum

Opis produktu

WskazaniaLek wskazany jest do stosowania w leczeniu ostrych oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych.**Działanie**Hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.**Sposób użycia**Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat:Pierwszy dzień leczenia: 100 mg (1 tabletki) 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg (1tabletki) 3 razy na dobę.Lek należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie wchłaniania furazydyny.Kreska dzieląca umożliwia podzielenie tabletki na dwie równe dawki.Lek stosuje się przez 7-10 dni. Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po 7 - 10 dniach, należy zwrócić się do lekarza.W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10 - 15 dniach.Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 15 lat Leku Furaginum HascoMAX nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.**Ważne**Przeciwwskazania:Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne nitrofuranu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.Pierwszy trymestr ciąży.Okres donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka.Dzieci i młodzież w wieku poniżej 15 lat.Niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy).Rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa.Niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej.**Skład**1 tabletki zawiera 100 mg furazydyny (Furazidinum), poprzednio stosowana nazwa: furagina.Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 28 mg sacharozy w tabletki.