

GAVISCON tabletki do rozgryzania i żucia 16 tabletek

Cena: 11,35 PLN



Opis słownikowy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek



Opis produktu

WskazaniaGaviscon o smaku mięty TAB jest stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksiem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży a także u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku.**Działanie**Lek Gaviscon o smaku mięty TAB tworzy ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni treści żołądkowej. Warstwa ta zapobiega cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej z żołądka, co powoduje zmniejszenie bólu i uczucia dyskomfortu w gardle oraz jamie ustnej. Zgaga może pojawiać się po posiłkach (głównie tłustych i ostrych) lub podczas ciąży albo u pacjentów z objawami zapalenia ściany przełyku (np. trudnościami i (lub) utrudnionym przełykaniem, bólem w jamie ustnej, wymiotami).**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Lek stosować doustnie.Dokładnie przeżuć tabletkę przed połknięciem.Stosowanie u dorosłych, w tym pacjentów w podeszłym wieku oraz u dzieci w wieku 12 lat i powyżej: w przypadku wystąpienia objawów od 2 do 4 tabletek po posiłkach i przed snem, do czterech razy na dobę.**Ważne**PrzeciwwskazaniaKiedy nie przyjmować leku Gaviscon o smaku mięty TAB:jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek składnik leku.**Skład**Substancjami czynnymi leku są: alginian sodu, wodorowęglan sodu oraz węglan wapnia.1 tabletkę zawiera: 250 mg alginianu sodu, 133,5 mg wodorowęglanu sodu oraz 80 mg węglanu wapnia.Substancje pomocnicze: mannitol (E421), makrogol 20 000, kopowidon, aspartam (E951), aromat mięty pieprzowej, magnezu stearynian oraz acesulfam potasowyTabletki nie zawierają cukru ani glutenu.

Galeria

