

## GLUKOZA proszek 75 g DIATHER



Cena: 3,49 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	75 g (saszet.)
Postać	pr.do p.rozt.doust.
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Rodzaj rejestracji	Dietetyczny środek spożywczy
Substancja czynna	Glucosum

### Opis produktu

**Opis**GLUKOZA proszek 75 g DIATHERDo postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy (krzywej cukrowej), w stanach niedoboru węglowodanów, w stanach wyczerpania, np. po długotrwałym wysiłku fizycznym, w stanach hipoglikemii u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą (np. przy przedawkowaniu insuliny).**Sposób użycia**doustny test tolerancji glukozy: po wykonaniu oznaczenia glukozy we krwi na czczo, 75 g glukozy (zawartość całego opakowania) rozpuścić w szklance wody (200 – 300 ml), roztwór wypić w ciągu 3-5 minut. Następne oznaczenie glukozy wykonuje się po 120 minutach.w stanach wyczerpania, po wysiłku: można przyjąć łyżeczkę do kilku łyżeczek glukozy (5g – 20g).w przypadku wystąpienia objawów obniżenia się poziomu cukru grożącego hipoglikemią – należy jak najszybciej przyjąć 10 – 20 g glukozy. 10 – 20 g glukozy powoduje wzrost glikemii po około 10 – 20 minutach. Aby uniknąć wystąpienia ponownego incydentu hipoglikemii, należy spożyć węglowodany złożone, a pomiar glikemii powtórzyć po 60 minutach. U chorych leczonych metodą intensywnej insulinoterapii, z zastosowaniem analogów insuliny lub podczas leczenia za pomocą osobistej pompy insulinowej, w przypadku hipoglikemii należy przyjąć 15 g glukozy doustnie i skontrolować glikemię po 15 minutach. Jeśli nadal utrzymuje się niska wartość glikemii, to należy powtórzyć podanie glukozy i skontrolować stężenie glukozy po kolejnych 15 minutach (reguła 15/15).**Skład**GlukozaWartość odżywcza (75 g):Energia (kJ/kcal) 1158 / 272Tłuszcze (g) 0,00Węglowodany (g) 68,3w tym cukry 68,3Białko (g) 0,00Sól (g) 0,00