

GROPRINOSIN FORTE 1000 mg granulat do sporządzania roztworu doustnego 10 saszetek

Cena: 14,95 PLN



Opis słownikowy

Dawka	1 g
Opakowanie	10 sasz. po 1,8 g
Postać	gran.do sporz.roztw.doust.
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Inosinum

Opis produktu

WskazaniaGROPRINOSIN FORTE 1000 mg granulat do sporządzania roztworu doustnego 30 saszetekWspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).Lek Groprinosin Forte może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.**Działanie**Groprinosin Forte jest lekiem przeciw wirusowym i zwiększającym odporność organizmu (pobudza czynność układu odpornościowego).Lek Groprinosin Forte zawiera substancję czynną - inozyny pranobeks, która hamuje in vitro namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes .**Sposób użycia**Lek należy stosować doustnie.Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawka dobową powinna być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę. Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku.Zalecana dawka dobową wynosi 50 mg/kg masy ciała/dobę (jednorazowo zwykle 1 g, tj. 1 saszetka 3 - 4 razy na dobę). Nie należy przyjmować więcej niż 4 saszetki na dobę.Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia .Zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała/dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych .Sposób podawaniaZawartość jednej saszetki rozpuścić w 1/2 szklanki letniej wody, wymieszać i wypić.**Ważne**Kiedy nie stosować leku Groprinosin ForteJeśli pacjent ma uczulenie na inozynę i pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku(wymienionych w punkcie 6).Objawami reakcji alergicznej mogą być : wysypka, świąd , trudności w oddychaniu , obrzęk twarzy, warg,gardła lub języka .**Skład**GEDEON RICHTER POLSKA Sp . z o.o.ul. Ks. J. Poniatowskiego 505 -825 Grodzisk Mazowiecki