


## GROPRINOSIN FORTE syrop 500mg/5ml 150 ml



Cena: 19,75 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	0,5 g/5ml
Opakowanie	150 ml (butelka)
Postać	syrop
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Inosinum pranobexum

### Opis produktu

**Wskazania**GROPRINOSIN FORTE syrop 0,5g/5ml 150mlWspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (*Herpes simplex*).**Działanie**Wykazuje działanie immunostymulujące i przeciwwirusowe, które wynika z wyraźnego pobudzenia odpowiedzi odpornościowej gospodarza in vivo pod wpływem działania leku. W badaniach in vitro inozyny pranobeks wykazuje działanie hamujące replikację wirusa opryszczki typu I (HSV-1).**Sposób użycia**Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawka dobową powinna być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę. Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie produktu leczniczego należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku: Zalecana dawka dobową wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (0,5 ml/kg mc. na dobę), zwykle 3 g (czyli 30 ml syropu na dobę), podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g na dobę (czyli 40 ml syropu na dobę). Dzieci powyżej 1 roku życia: 50 mg/kg masy ciała na dobę, zwykle 0,5 ml/kg mc. podawanych w 3 lub 4 równych dawkach podzielonych w ciągu doby; stosować zgodnie z poniższą tabelą. \*W celu odmierzenia zalecanej objętości, należy stosować dołączoną do opakowania miarkę o pojemności 20 ml, z podziałką co 2,5 ml.

Sposób podawania: Produkt leczniczy przeznaczony jest wyłącznie do podawania doustnego.

Masa ciałaDawkowanie\*10 – 14 kg 3 x 2,5 ml15 – 20 kg 3 x 2,5 do 3,5 ml21 – 30 kg 3 x 3,5 do 5 ml31 – 40 kg 3 x 5 do 7,5 ml41 – 50 kg 3 x 7,5 do 9 ml**WażnePrzeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Inozyny pranobeksu nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.**Skład**1 ml syropu zawiera 100,0 mg inozyny pranobeks: kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Substancje pomocnicze o znanym działaniu 1 ml syropu zawiera: 420 mg maltitolu, 1,8 mg metylu parahydroksybenzoesanu, 0,2 mg propylu parahydroksybenzoesanu.**Postać farmaceutyczna:** Syrop. Przezroczysty, bezbarwny lub różowawy syrop o smaku i zapachu malinowym.**Opakowanie:** 150 ml syropu.**Producent**Gedeon Richter Polska Spółka z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.