

GUAJAZYL syrop 200 g ESPEFA



Cena: 11,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,125 g/5ml
Opakowanie	200 g
Postać	syrop
Producent	ESPEFA S.P.CH-F.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Guaifenesinum

Opis produktu

Wskazania GUAJAZYL syrop 200 g ESPEFA Lek wykrztuśny stosowany w leczeniu kaszlu. **Działanie** Guajazyl jest lekiem wykrztuśnym. Po podaniu doustnym zwiększa objętość wydzieliny śluzowej w oskrzelach i tchawicy, a także zmniejsza jej lepkość. Łagodzi kaszel i ułatwia odkrztuszanie. **Sposób użycia** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek stosuje się doustnie. 1 łyżeczka do herbaty zawiera 5 ml, to jest 6,2 g syropu. 1 łyżka stołowa zawiera 15 ml, to jest 18,7 g syropu. Zalecana dawka Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku Guajazyl to: u dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka do herbaty) 3 lub 4 razy na dobę. u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu (1 łyżka stołowa) 3 lub 4 razy na dobę. Syrop zażywać po posiłku, popijając małą ilością płynu. **Ważne** Kiedy nie stosować leku Guajazyl: jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; u dzieci w wieku poniżej 6 lat; u pacjentów z niewydolnością wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, uszkodzeniami mózgu, chorobami psychicznymi - ze względu na zawartość etanolu. **Działania niepożądane** Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zaburzenia żołądka i jelit: uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, wymioty, biegunka. Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, bóle głowy. Zaburzenia układu immunologicznego: wysypka skórna, pokrzywka. **Ostrzeżenia i środki ostrożności** Nie należy stosować leku bez zalecenia lekarza u osób palących tytoń, pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłym zapaleniem oskrzeli lub rozedmą płuc. Guajazyl zawiera sacharozę. Lek zawiera 9,86 g sacharozy (cukru) w 15 ml syropu (1 łyżka stołowa). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Guajazyl zawiera barwnik azowy czerwień koszenilowa (E 124). Lek może powodować reakcje alergiczne. Guajazyl zawiera etylu parahydroksybenzoosan. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Guajazyl zawiera etanol 15 ml syropu (1 łyżka stołowa), pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera 562 mg etanolu. Należy wziąć to pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Okres ważności po otwarciu opakowania: 28 dni. Chronić od światła i wilgoci. **Skład** Substancją czynną leku jest gwajafenezyna. 5 ml syropu zawiera 125 mg gwajafenezyny. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, czerwień koszenilowa (E 124), etylu parahydroksybenzoosan, etanol, esencja rumowa spożywcza, powidon, woda oczyszczona.