

## GYNOXIN 2% krem dopochwowy 30 g

Cena: 29,90 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	0,02 g/g
Opakowanie	30 g (tuba)
Postać	krem dopochw.
Producent	RECORDATI S.P.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Fenticonazoli nitras

### Opis produktu

**Wskazania** GYNOXIN 2% krem dopochwowy 30 g Krem dopochwowy Gynoxin® wskazany jest do stosowania przy drożdżycy błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy) oraz w leczeniu zakażeń mieszanych pochwy. Lek na infekcje intymne Gynoxin® można zastosować, jeśli kobieta skarży się na: silny, dokuczliwy świąd okolic intymnych; ból podczas stosunku i przy oddawaniu moczu; upławy grudkowate, serowate, bezzapachowe. **Działanie** Gynoxin® to krem dopochwowy na infekcje intymne bez recepty. Nie tylko usuwa objawy zakażenia, ale też działa na bezpośrednią przyczynę infekcji. Gynoxin® to jedyny krem dopochwowy na rynku, zawierający fentikonazol. Jest to substancja o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. Działa również przeciwbakteryjnie na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne. **Sposób użycia** Krem należy stosować za pomocą aplikatora (po umyciu nadaje się do wielokrotnego użytku). Wprowadzić zawartość aplikatora (ok. 5 g) głęboko do pochwy. Stosować: 2 razy na dobę – wieczorem przed snem i rano – przez 3 kolejne dni lub 1 raz na dobę – wieczorem przed snem – przez 6 kolejnych dni. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. **Ważne!** Nie stosować leku przy nadwrażliwości na fentikonazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. **Skład** Substancją czynną leku Gynoxin® jest fentikonazol. 100 g kremu dopochwowego zawiera 2 g azotanu fentikonazolu (*Fenticonazoli nitras*). Substancje pomocnicze to: estry makrogolu z kwasami tłuszczowymi (C12-C18), olej migdałowy pierwszego tłoczenia, glikol propylenowy, alkohol cetylowy, glicerolu monostearnian, lanolina uwodorniona, sodu edetynian i woda oczyszczona. Postać farmaceutyczna: krem dopochwowy

Galeria



**GYNOXIN<sup>®</sup> marka nr1**

**GYNOXIN<sup>®</sup> OPTIMA**  
 20 mg/200 mg krem dopochwowy  
 Fentikonazol nitrat

Podanie dopochwowe  
 Lek na leczenie grzybiczych zakażeń śluzówki pochwy

1 tube po 30 g

RECORDATI

Stosuj gdy:

- swędzi
- boli
- piecze
- masz upławy

Najszerzy zakres działania:  
**infekcje grzybicze i mieszane**

**PRZYNOŚI ULGĘ I LECZY**

GYNOXIN<sup>®</sup> OPTIMA nie tylko eliminuje nieprzyjemne objawy i kłóć inymym ale również ją leczy!

**KREM Z APLIKATOREM**

łatwo i wygodno aplikacja przy użyciu anatomicznego aplikatora.

**GYNOXIN<sup>®</sup> OPTIMA**

**GYNOXIN<sup>®</sup>**  
 to pierwszy i jedyny lek z **fentikonazolem**.

**POTRÓJNY MECHANIZM** - silne działanie przeciwgrzybicze

**SZEROKI ZAKRES DZIAŁANIA PRZECIWBAKTERYJNEGO**:  
 • bakterie Gram+  
 • bakterie Gram-

**Krótką terapia**  
**3 DNI = PEŁNA KURACJA**

**GYNOXIN<sup>®</sup> OPTIMA**

- ✓ Największa dawka leku bez recepty\*
- ✓ Działa jeszcze 72 h po aplikacji leku hamując postęp zakażenia\*\*

**GYNOXIN<sup>®</sup>**  
**Skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi\***

Wysoka skuteczność przeciwgrzybicza leku Gynoxin<sup>®</sup> została potwierdzona w licznych badaniach klinicznych:

- do 100%** Odsetek klinicznych wyliczeń grzybiczych zapoleń pochwy i sromu
- do 100%** Odsetek usunięcia drożdżaka *Candida albicans* z miejsca zakażenia

\*Na 80% kobiet najwcześniejszym czasie badania (3 dni po aplikacji) 70% kobiet zgłaszało całkowitą poprawę objawów grzybiczych zakażeń śluzówki pochwy i sromu. W badaniu klinicznym nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych. W badaniu klinicznym nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych. W badaniu klinicznym nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwłaszcza uważaj na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**