

GYNOXIN PROTECT 10 globulek dopochwowych po 2 g



Cena: 19,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 glob. po 2 g
Postać	glob.dopoch.
Producent	RECORDATI POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisGynoxin® PROTECT wspomaga proces leczenia objawów związanych z zapaleniem sromu i pochwy różnego pochodzenia. Chroni błonę śluzową pochwy przed namnażaniem chorobotwórczych mikroorganizmów, przywraca prawidłowe pH pochwy i łagodzi objawy, w tym świąd. Wspomaga regenerację śluzówki po leczeniu. Wspomaga proces leczenia: Przywraca prawidłowy odczyn pH pochwy. Chroni przed patogenami. Nawilża. Globulka dopochwowa Gynoxin® PROTECT zalecana jest jako uzupełnienie leczenia infekcji intymnych różnego pochodzenia. **KIEDY ZASTOSOWAĆ WYRÓB MEDYCZNY GYNOXIN® PROTECT:** po zakończeniu miejscowego leczenia infekcji intymnej. **W profilaktyce nawrotu infekcji intymnych** W suchości pochwy. W mechanicznych uszkodzeniach śluzówki pochwy. **Sposób użycia** Zaleca się stosowanie 1 globulki dopochwowej raz na dobę przez co najmniej 5 kolejnych dni, najlepiej wieczorem przed snem. Czas stosowania zależy od zmiany nasilenia objawów; w razie potrzeby Gynoxin® PROTECT można stosować przez dłuższy okres. Czas stosowania nie powinien przekraczać 30 dni. **Wskazówki dotyczące stosowania:** Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania dopochwowego, należy go użyć natychmiast po otwarciu plastikowego blistra. Zaleca się dokładne umycie rąk przed użyciem. Zaleca się stosowanie tego produktu wieczorem, przed snem, w następujący sposób: należy dokładnie umyć okolice narządów płciowych łagodnym środkiem myjącym i osuszyć; pojedynczą globulkę dopochwową należy oderwać od blistra, pociągając wzdłuż przerywanej linii; dwie plastikowe klapki należy oddzielić od siebie i delikatnie je pociągnąć, nie otwierając całkowicie opakowania; globulkę dopochwową należy delikatnie wyjąć

z opakowania; leżąc na plecach, globulkę dopochwową należy delikatnie włożyć palcami do pochwy tak głęboko, jak to jest możliwe, aby ułatwić szybkie jej rozpuszczenie. Zaleca się pozostanie w pozycji leżącej, aby zapewnić optymalne rozprowadzenie produktu i uniknąć przypadkowego wydostania się globulki z pochwy. Zwykle podczas stosowania globulek dopochwowych GYNOXIN® PROTECT może pojawić się niewielka ilość białawej i bezwonnej wydzieliny z pochwy, zazwyczaj rano po wieczornym zastosowaniu.

WażnePrzeciwwskazania / Kiedy nie stosować wyrobu medycznego Gynoxin® PROTECT? Nie ma szczególnych przeciwwskazań do stosowania globulek dopochwowych GYNOXIN® PROTECT. Nie należy stosować produktu w przypadku znanej nadwrażliwości lub nietolerancji na którykolwiek składnik preparatu. Obecnie nie są znane żadne interakcje związane ze stosowaniem globulek dopochwowych GYNOXIN® PROTECT. **Ostrzeżenia i środki ostrożności:** Nie należy stosować tego wyrobu medycznego podczas miesiączki. W przypadku jednoczesnego stosowania innych produktów (w tym leków), należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nienaruszone opakowanie bezpośrednio jest warunkiem odpowiedniej

jakości i funkcjonalności produktu. Nie należy stosować tego wyrobu medycznego po upływie terminu ważności lub jeśli opakowanie jest uszkodzone lub w jakikolwiek sposób naruszone w momencie pierwszego otwarcia. Nie połykać. W razie przypadkowego połknięcia, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalem. Należy unikać kontaktu z oczami. Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu z oczami, zaleca się dokładne umycie ciepłą wodą. Nie zamrażać. Gynoxin® PROTECT w ciąży i w czasie karmienia piersią Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania podczas ciąży i karmienia piersią; w tych przypadkach należy zasięgnąć porady lekarza. Przechowywanie / Okres ważności: Wyrób medyczny należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia, w temperaturze poniżej 25°C. Termin ważności dotyczy produktu prawidłowo przechowywanego w nieotwartym opakowaniu. Po użyciu nie należy wyrzucać produktu ani jego opakowania do środowiska. **Skład** Co zawiera wyrób medyczny Gynoxin® PROTECT – skład: Glicerydy półsyntetyczne, woda osmotyczna, krzemionka koloidalna, rozpuszczalny w tłuszczach ekstrakt z nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L), ImmunoBlend – mieszanina tyndalizowanych bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Streptococcus thermophilus), Sunfiber® - częściowo hydrolizowana guma guar, octan witaminy E, kwas mlekowy, palmitynian witaminy A. **Producent** Importer/ Podmiot prowadzący reklamę: Recordati Polska sp. z o.o. Autoryzowany przedstawiciel: Erbozeta Austria GmbH Producent: Logus Pharma S.r.l.

Galeria



Innowacyjne połączenie składników dla **regeneracji śluzówki** pochwy oraz przywrócenia **naturalnego pH** po leczeniu infekcji.

Działanie GYNOXIN® PROTECT

- ✓ Wspomaga regenerację śluzówki po leczeniu
- ✓ Utrwala efekt leczenia:
 - Przywraca prawidłowy odczyn pochwy
 - Chroni przed patogenami
 - Nawilża

GYNOXIN® PROTECT

UNIKATOWA KOMPOZYCJA

- **ImmunoBlend** - mieszanina 4 szczepów tyndalizowanych bakterii kwasu mlekowego:
 - Lactobacillus casei
 - Lactobacillus acidophilus
 - Lactobacillus plantarum
 - Streptococcus thermophilus
- **Wyciąg z nagietka lekarskiego** (Calendula officinalis L)
- **Sunfiber®** - częściowo hydrolizowana guma guar
- **Kwas mlekowy**
- **Witamina A**
- **Witamina E**

GYNOXIN® PROTECT

KOMPLEKSOWE DZIAŁANIE

- **IMMUNO BLEND**: tyndalizowane bakterie przylegają do nabłonka blokując zagrzeźnienie patogenów (działanie barierowe)
- **KWAS MLEKOWY**: tworzy korzystne środowisko do rozwoju pałeczek kwasu mlekowego zmniejszających pH na kwaśne, co utrudnia namnażanie patogenów
- **WITAMINA A I E**: nawilżenie i regeneracja śluzówki
- **SUNFIBER®**: powłoka i nawilża chroniąc śluzówkę, zapewnia komfort oraz działa przeciwzapalnie
- **WYCIĄG Z NAGIETKA LEKARSKIEGO**: nawilża i obsłania ochronnie, łagodzi dyskomfort, działa przeciwzapalnie i przeciwdrobnoustrojowo

GYNOXIN® PROTECT

KIEDY STOSOWAĆ GYNOXIN® PROTECT

- Zawsze po zakończeniu miejscowego leczenia infekcji intymnej
- W profilaktyce nawrotu infekcji intymnych
- W suchości pochwy
- W mechanicznych uszkodzeniach śluzówki pochwy

Dawkowanie:
 1 globulka dopochwowa raz na dobę przez minimum 5 dni

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Recordati Polska Sp. z o.o. ul. Złotnicza 3, 01-241 Łódź, tel. 42 715 80 29, www.aptekazawiszy.pl
 Wyroby medyczne: 10 globulek dopochwowych