

HASCOSEPT o smaku miętowym 24 pastylki



Cena: 13,30 PLN

Opis słownikowy

Dawka	3 mg
Opakowanie	24 pastyl.
Postać	pastyl.twarde
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Benzydaminum

Opis produktu

Opis

smak miętowy

Podwójne działanie- pełne zwycięstwo!

Dlaczego pastylki?

Hascosept to lek, który zwalcza objawy, a gdy inni na tym kończą on działa dalej – zwalcza też przyczynę.¹

pastylki - kompleksowy lek na ból gardła

¹ Charakterystyka Produktu Leczniczego Hascosept, pastylki twarde, pkt. 5.1.:Hascosept wykazuje działanie antyseptyczne.

to sprawdzony i bezpieczny lek na gardło.²

Zawiera benzydaminę - substancję o działaniu potwierdzonym badaniami klinicznymi.

Może być stosowany u dzieci od 6-tego roku życia i osób dorosłych.³

Może być stosowany przez diabetyków. Nie zawiera cukru.

O orzeźwiającym miętowym smaku.

² Benzydamina to substancja szeroko przebadana w badaniach klinicznych, o ugruntowanej pozycji w leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła – stosowana od niemal 60 lat. ³ Charakterystyka Produktu Leczniczego Hascosept smak miętowy, 3 mg, pastylki twarde. Data zatwierdzenia 01.2020.

Jak działa ?

Zawiera chlorowodorek benzydamininy.¹

Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie - hamuje syntezę prostaglandyn, substancji odpowiedzialnych za powstanie stanu zapalnego i bólu.

Działa przeciwobrzękowo - zmniejsza obrzęk i przepuszczalność naczyń krwionośnych.

Działa odkażająco – wykazuje miejscowe działanie antyseptyczne.

Działa miejscowo znieczulająco - blokuje przewodzenie bodźców bólowych.

¹ Charakterystyka Produktu Leczniczego Hascosept, pastylki twarde, pkt. 5.1.:Hascosept wykazuje działanie antyseptyczne.

Dla kogo pastylki?
Uniwersalne rozwiązanie na każdy ból gardła

„Drapanie, ból i trudności w przełykaniu. U nas powtarza się to kilka razy w roku. Zaczynają chorować dzieciaki, a potem my z mężem.”

Hascosept pastylki mogą być stosowane u dzieci od 6. roku życia oraz u dorosłych.

„Praca i rodzina są dla mnie najważniejsze. Nie mogę chorować. Potrzebuję czegoś co szybko pomoże na ból gardła.”

Hascosept szybko przynosi ulgę. Niweluje stan zapalny, zwalcza ból i obrzęk.

„Na co dzień pracuję głosem. Nie mogę sobie pozwolić na dłuższą niedyspozycję. Potrzebuję efektywnego rozwiązania na pierwsze objawy bólu gardła.”

Hascosept leczy objawy bólu gardła i zwalcza jego przyczyny.

- wybierz lek na gardło w formie, którą lubisz

pastylki: smak cytrynowo-miodowy smak miętowy

Hascosept - spray

Hascosept Forte - spray

Hascosept - płyn do płukania gardła

SPRAWDŹ

Szczegóły produktu pastylki

Skład Opakowanie Stosowanie Przechowywanie Inne informacje

Skład:

1 pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminę chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: izomalt(E 953), acesulfam potasowy(E 950), kwas cytrynowy jednowodny, lewomentol, aromat miętowy, żółcień chinolinowa (E 104), błękit patentowy V (E 131).

Postać farmaceutyczna:

pastylki twarde do ssania; postać okrągłych pastylek barwy zielonej miętowym smaku

Opakowanie:

24 pastylki twarde w opakowaniu.

Stosowanie:

Lek przeznaczony jest do ssania.

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat:

Zalecana dawka to 1 pastylka 3 razy na dobę. Pastylkę należy ssać powoli. Nie żuć ani nie połykać. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać 7 dni.

Stosowanie u dzieci:

Ze względu na postać farmaceutyczną lek Hascosept smak miętowy nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 6 lat. U dzieci w wieku od 6 do 11 lat, lek powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.

Przechowywanie: Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku. Przechowywać w blistrze w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Inne informacje:

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przeciwwskazania:

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie zaleca się stosowania leku, jeśli u pacjenta występuje uczulenie na kwas acetylosalicylowy (aspirynę) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występowała astma oskrzelowa, gdyż może on spowodować duszność. U niektórych pacjentów owrzodzenie jamy ustnej i gardła może być jedynie objawem innego ciężkiego procesu chorobowego. W przypadku gdyby objawy nasilały się lub nie ustępowały po 3 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Hascosept smak miętowy a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie badano oddziaływania leku Hascosept pastylki z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Hascosept smak miętowy nie należy stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Miejscowe stosowanie benzydaminu w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Hascosept smak miętowy zawiera izomalt

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przedawkowanie

Bardzo rzadko donoszono o objawach przedawkowania (pobudzenie, drgawki, potliwość, niezborność, drżenie, wymioty) u dzieci, po spożyciu leków zawierających benzydaminę w dawkach około stukrotnie większych niż dawka zawarta w pojedynczej pastylce.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Hascosept smak miętowy

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej liczby pastylek, należy natychmiast udać się do lekarza, biorąc ze sobą opakowanie leku. Lekarz wdroży odpowiednie postępowanie.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Hascosept smak miętowy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działaniami niepożądanymi o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) są reakcje alergiczne, które mogą być ciężkie. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

nały obrzęk jamy ustnej lub gardła, trudności w oddychaniu, wysypka lub świąd, szczególnie jeśli obejmuje całe ciało.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób): reakcje skórne w wyniku nadwrażliwości na światło.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): pieczenie lub suchość w jamie ustnej. W razie wystąpienia tych objawów, można je zmniejszyć wypijając szklankę wody powoli, małymi łykami.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): skurcz krtani.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego u płodu, reakcja alergiczna (nadwrażliwość), ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny) z objawami takimi jak: trudności w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia, silny świąd skóry lub wystające guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła; reakcja taka może zagrażać życiu, niedoczulica jamy ustnej (miejscowa utrata wrażliwości błony śluzowej jamy ustnej).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław Informacja o leku tel. 22 742 00 22 e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

1 Charakterystyka Produktu Leczniczego Hascosept, pastylki twarde, pkt. 5.1.:Hascosept wykazuje działanie antyseptyczne 2 Benzydamina to substancja szeroko przebadana w badaniach klinicznych, o ugruntowanej pozycji w leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła – stosowana od niemal 60 lat. 3 Charakterystyka Produktu Leczniczego Hascosept smak miętowy, 3 mg, pastylki twarde. Data zatwierdzenia 01.2020.

Hascosept smak miętowy, 3 mg, pastylki twarde. Hascosept smak cytrynowo-miodowy, 3 mg, pastylki twarde. Skład: 1 pastylka zawiera 3 mg benzydminy chlorowodorku (Benzydmini hydrochloridum), co odpowiada 2,68 mg benzydminy. **Postać farmaceutyczna:** pastylki twarde. **Wskazania do stosowania:** Produkt leczniczy jest wskazany u dorosłych i dzieci powyżej 6 lat w leczeniu dolegliwości i objawów(ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Podmiot odpowiedzialny:** „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

Hascosept 1,5 mg/g roztwór do stosowania w jamie ustnej. Skład: 100 g roztworu zawiera benzydminy chlorowodorek (Benzydmini hydrochloridum) 0,15 g. **Postać farmaceutyczna:** roztwór do stosowania w jamie ustnej. **Wskazania do stosowania:** Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Podmiot odpowiedzialny:** „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

Hascosept Forte, 3 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. Skład: 1 ml roztworu zawiera: 3 mg benzydminy chlorowodorku (Benzydmini hydrochloridum). Pojedyncza dawka aerozolu (0,14 ml) zawiera 0,42 mg benzydminy chlorowodorku. **Postać farmaceutyczna:** aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. **Wskazania do stosowania:** Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła, tj.: w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, w zapaleniu krtani, w zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii, a także po intubacji. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Podmiot odpowiedzialny:** PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

2020_0910b

</html>

Galeria



BEZ CUKRU
 24



**Wybierz smak,
 który lubisz**



miętowy cytrynowo - miodowy