

# HASCOVIR LIPOŻEL PRO 50 mg/g żel 3 g

Cena: 15,65 PLN



## Opis słownikowy

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

## Opis produktu

### Opis

Hascovir Lipożel pro krem 0,05g/g - 3 g

Opryszczka wargowa i zmiany opryszczkowe na twarzy są wynikiem zakażenia wywołanego przez wirus opryszczki zwykłej (Herpes simplex - HSV-1) i charakteryzuje się występowaniem pojedynczych lub mnogich skupisk małych pęcherzyków, wypełnionych, treścią surowiczą, na nieznacznie zmienionym zapalnie (Cockerell, 1996, Emmert, 2000, Yeung-Yue, 2002).

Zakażenie HSV jest zazwyczaj samoograniczającym się procesem chorobowym, i w znacznej większości przypadków nie jest potrzebna konsultacja lekarska, wystarczające jest samodzielne stosowanie leczenia miejscowego.

### Wskazania

Leczenie opryszczki wargowej (tzw. zimno) i zmian opryszczkowych na twarzy.

### Właściwości

Produkt **Hascovir Lipożel pro** zawiera acyklowir i jest przeznaczony do miejscowego stosowania w celu leczenia opryszczki wargowej i

zmian opryszczkowych na twarzy.

Acyklowir jest substancją czynną o ugruntowanym zastosowaniu medycznym, stosowaną jako lek przeciwwirusowy od ponad 30 lat.

Mechanizm działania acyklowiru jest dobrze poznany, acyklowir jest prolekiem, który w wyniku fosforylacji przechodzi do formy czynnej i wykazuje działanie przeciwwirusowe.

Bezpieczny mechanizm działania oraz miejscowe zastosowanie produktu **Hascovir Lipożel pro** gwarantuje wysoki profil bezpieczeństwa produktu.

Acyklowir był przedmiotem wielu badań klinicznych, których wyniki wskazują na wysoką skuteczność w leczeniu infekcji wirusem HSV, wiele badań potwierdza skuteczność i bezpieczeństwo preparatów stosowanych miejscowo.

### Zalecane użycie

Lek **Hascovir Lipożel pro** należy nakładać 5 razy na dobę na chorobowo zmienione miejsca na skórze w odstępach około czterogodzinnych, z przerwą nocną.

Lek działa najskuteczniej, jeżeli rozpoczyna się leczenie podczas pierwszych objawów np. swędzenie, pieczenie.

Leczenie powinno trwać co najmniej przez 4 dni.

Jeżeli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych leczenie można przedłużyć do 10 dni.

Jeśli zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza.

### Składniki

1g żelu zawiera substancję czynną: acyklowir 50mg oraz substancje pomocnicze.

### Producent

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

ul. Żmigrodzka 242e51-131 Wrocław

tel. (+48 71) 352 95 22