

HIRUDOID żel 100 g

Cena: 29,90 PLN



Opis słownikowy

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

WskazaniaHIRUDOID żel 100 g

Do stosowania miejscowego na skórę w przypadku: tępych urazów z krwiakami lub bez krwiaków, zapalenia żył powierzchownych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym.

DziałanieHirudoid® dzięki zawartości polisarczanu mukopolisacharydowego zapobiega tworzeniu się zakrzepów powierzchownych, stymuluje ich wchłanianie, wykazuje miejscowe działanie przeciwzakrzepowe oraz przyspiesza wchłanianie krwiaków i obrzęków. Przyczynia się do regeneracji struktur tkankowych.**Sposób użycia**Nakładać 1-3 razy na dobę na miejsca zmienione chorobowo lub jeśli zachodzi potrzeba, częściej. W zależności od wielkości leczonej powierzchni zazwyczaj wystarcza nałożenie od 3 do 5 cm maści/żelu. Hirudoid® w postaci maści/żelu należy wmasować w miejsca zmienione chorobowo.**Ważne**Do określenia częstości występowania działań niepożądanych przyjęto następującą klasyfikację: bardzo często ($\geq 1/10$), często ($\geq 1/100$ do $< 1/10$), niezbyt często ($\geq 1/1000$ do $< 1/100$), rzadko ($\geq 1/10000$ do $< 1/1000$), bardzo rzadko ($< 1/10000$), częstość nieznaną (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).Zaburzenia skóry i tkanki podskórnejBardzo rzadko: miejscowe reakcje nadwrażliwości, takie jak zaczerwienienie skóry, które zazwyczajprzemijają szybko po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego.Zaburzenia układu immunologicznego4-hydroksybenzoesan metylu i propylu może powodować reakcje alergiczne.**Skład**HIRUDOID® maść/żel 40 g 0,3/100mg (*Mucopolisaccharidum polisulphatum*)=