

IBUPREX MAX 400 mg 12 tabletek

Cena: 5,65 PLN



Opis słownikowy

| | |
|--------------------|--------------------|
| Dawka | 0,4 g |
| Opakowanie | 12 tabl. |
| Postać | tabl.powl. |
| Producent | OLIMP LABORATORIES |
| Rodzaj rejestracji | Lek |
| Substancja czynna | Ibuprofenum |

Opis produktu

WskazaniaDolegliwości bólowe o różnej etiologii o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle kostne i stawowe.**Działanie**Substancją czynną leku jest ibuprofen należący do grupy leków nazywanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Ibuprofen zmniejsza gorączkę i wywiera działanie przeciwbólowe.Lek jest wskazany w objawowym leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego m.in.: bólu głowy, migreny, bolesnego miesiączkowania, bólu kostnego, mięśniowego i stawowego (także w wyniku urazów), bólu zębów, bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej oraz leczeniu gorączki m.in. w przebiegu zakażeń górnych dróg oddechowych, przeziębienia i grypy lub innych chorób zakaźnych.**Sposób użycia**Leku nie należy podawać powyżej 3 dni w leczeniu gorączki i 4 dni w leczeniu bólu bez konsultacji z lekarzem. Jeśli u młodzieży podawanie leku jest konieczne przez dłużej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu, należy skontaktować się z lekarzem.Leczenie gorączki i bólu, w tym bólu głowy, migreny, bólu zębów, bólu kości, mięśni i stawów, bólu plecówDorośli, osoby w podeszłym wieku, młodzież (w wieku powyżej 12 lat): 400 mg (1 tabletkę) do 3 razy na dobę w odstępach co 4 - 6 godzin. Nie należy przekraczać dawki 1200 mg (3 tabletki) na dobę.Bolesne miesiączkowanie:400 mg (1 tabletkę) w zależności od potrzeb 1-3 razy na dobę z zachowaniem odstępu między dawkami 4 - 6 godzin. Nie należy przekraczać dawki 1200 mg (3 tabletki) na dobę.Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci (w wieku poniżej 12 lat).**Ważne**PrzeciwwskazaniaKiedy nie stosować leku IBUPREX MAX:jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego lekujeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywka po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ)jeśli u pacjenta występuje lub występowała nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicyjeśli u pacjenta wystąpiło kiedykolwiek owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związane z leczeniem NLPZjeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek, choroba wieńcowa lub ciężka niewydolność sercau dzieci w wieku poniżej 12 latjeśli u pacjenta występuje krwawieniejeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego pacjentów z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów)**Skład**Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każda tabletkę zawiera 400 mg ibuprofenu.Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: rdzeń tabletki (celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza 5 cP, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, woda oczyszczona, makrogl 6000, sodu stearylofumarany), otoczka Opadry 200 White (alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogl 3350, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu węglan).