

## IBUPROM dla Dzieci Forte 0,2g/5ml 150 ml



Cena: 33,73 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	0,2 g/5ml
Opakowanie	150 ml
Postać	zaw.doust.
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Ibuprofenum

### Opis produktu

#### Opis

Na jakie dolegliwości? Dlaczego Ibuprom? Jak stosować Ibuprom? Co zawiera? Szczegóły produktu

Na jakie dolegliwości?

Gorączka

Ból gardła

Ból mięśni, stawów, kości

Ból pooperacyjny

Ból ucha

Bolesne żąbkowanie

Ból zębów

Ból głowy

Dlaczego Ibuprom?

Usuwa gorączkę, ból i stan zapalny

Szybko obniża gorączkę

Działa nawet **do 8h**

Mało płynu do podania tylko **3 razy dziennie**

**Smak truskawkowy** który smakuje dzieciom\*

**Wysoko oceniany przez rodziców** (aktualna ocena w Ceneo - 4,9 / 5)

**Od 3. miesiączycia**

Można stosować **na czczo**

**Bez glutenu, bez cukru i bez barwników**

\* IQS „OTC Tracking Leków na gorączkę i ból dla dzieci” luty 2020.

Jak stosować Ibuprom?

Trzy proste kroki:

Określ dawkę wyszukując aktualną wagę dziecka w kalkulatorze dawkowania leku Ibuprom dla Dzieci Forte.

Za pomocą strzykawki odmierzyć odpowiednią ilość leku.

Podawaj strzykawką skierowaną w stronę ścianki policzka (nie na wprost), żeby nie spowodować zakrztuszenia.

Maksymalna ilość dawek w ciągu doby:

Stosować u dzieci powyżej 3 miesiąca życia

Należy zachować przerwę między dawkami 6 do 8 godzin

Nie wolno przyjmować leku przez okres ponad 3 dni bez konsultacji z lekarzem

PAMIĘTAJ!

Wpisz datę pierwszego otwarcia butelki w specjalnie przygotowanym białym polu na boku opakowania...

Skład

Ibuprom dla Dzieci Forte to lek wysokiej jakości

**BEZ GLUTENU**

**BEZ CUKRU**

**BEZ BARWNIKÓW**

Substancją czynną leku jest **ibuprofen**.

**Pozostałe składniki to:** sodu benzoesan (E 211), kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, sacharyna sodowa, sodu chlorek, hypromeloza 15 cP, guma ksantan, maltitol ciekły, glicerol, taumatyna (E 957), aromat truskawkowy (zawiera substancje identyczne z naturalnymi aromatami, naturalne aromaty, maltodekstrynę, cytrynian trietylu, glikol propylenowy i alkohol benzylowy), woda oczyszczona.

Dostępne opakowania

Ibuprom dla Dzieci Forte jest **dostępny również w pojemności:**

Ibuprom dla Dzieci Forte **100 ml**

Sprawdź

Szczegóły produktu

Skład i właściwości Wskazania Dawkowanie Przeciwwskazania Inne informacje

**Substancja czynna: Ibuprofen 200 mg / 5 ml;** Substancje pomocnicze: benzoesan sodu (E 211), kwas cytrynowy bezwodny, cytrynian sodu, sacharyna sodowa, chlorek sodu, hypromeloza 15 cP, guma ksantan, maltitol ciekły, glicerol, taumatyna (E 957), aromat truskawkowy, woda oczyszczona.

**Właściwości** Ibuprofen ma działanie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne. Działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe ibuprofenu rozpoczyna się w ciągu 30 minut od przyjęcia produktu leczniczego. Po podaniu doustnym ibuprofen jest częściowo wchłaniany w żołądku, a następnie całkowicie w jelicie cienkim. Po zmetabolizowaniu w wątrobie nieczynne farmakologicznie metabolity są całkowicie wydalane.

**Gorączka różnego pochodzenia** (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego).

**Bóle różnego pochodzenia o nasileniu łagodnym do umiarkowanego:**

bóle głowy, gardła i mięśni np. w przebiegu zakażeń wirusowych, bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (nadwyrężenia, skręcenia) bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania, bóle głowy, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego,

Do podania doustnego.

Do opakowania dołączony jest dozownik w formie strzykawki 5 ml z podziałką ułatwiającą dawkowanie.

Ból i gorączka: dawka dobową produktu leczniczego Ibuprom dla Dzieci Forte wynosi 20 do 30 mg/kg masy ciała w dawkach podzielonych.

Schemat dawkowania z zastosowaniem dołączonego do opakowania dozownika może być osiągnięty następująco:

**Niemowlęta od 3 do 6 miesięcy (5 - 7,6 kg):** 3 razy po 1,25 ml w ciągu doby (co odpowiada 150 mg ibuprofenu/dobę).  
**Niemowlęta od 6 do 12 miesięcy (7,7 - 9 kg):** 3 do 4 razy po 1,25 ml w ciągu doby (co odpowiada 150-200 mg ibuprofenu/dobę).  
**Dzieci od 1 do 3 lat (10 - 15 kg):** 3 razy po 2,5 ml w ciągu doby (co odpowiada 300 mg ibuprofenu/dobę).  
**Dzieci od 4 do 6 lat (16 - 20 kg):** 3 razy po 3,75 ml w ciągu doby (co odpowiada 450 mg ibuprofenu/dobę).  
**Dzieci od 7 do 9 lat (21 - 29 kg):** 3 razy po 5 ml w ciągu doby (co odpowiada 600 mg ibuprofenu/dobę).  
**Dzieci od 10 do 12 lat (30 - 40 kg):** 3 razy po 7,5 ml w ciągu doby (co odpowiada 900 mg ibuprofenu/dobę).  
**Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:** dawką rekomendowaną w objawowym leczeniu bólu i gorączki jest 3 razy po 10 ml w ciągu doby, do ustąpienia objawów.

Należy zachować przerwę pomiędzy dawkami 6 do 8 godzin.

Wstrząsnąć przed użyciem. Produkt leczniczy może być podany bezpośrednio lub rozpuszczony w wodzie lub soku. U osób z wrażliwym przewodem pokarmowym zaleca się zażywać produkt leczniczy podczas posiłku lub popijanie mlekiem.

Nie stosować u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, porzywki lub astmy oskrzelowej ani w połączeniu z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Nie stosować w III trymestrze ciąży i w czynnej chorobie wrzodowej przewodu pokarmowego.

**Okres ważności** 3 lata Po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy. Wpisz datę otwarcia butelki na białym polu na kartoniku.

**Przechowywanie** Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego. Po pierwszym otwarciu: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**Opakowanie** 100 ml / 150 ml Kartonik ze specjalnym polem do wpisania daty pierwszego otwarcia butelki. Butelka z zakrętką zabezpieczającą przed dostępem do dzieci z łącznikiem do strzykawki. Doustna strzykawka o pojemności 5 ml.

**Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria



i korzystaj z zawiesziny przez 6 miesięcy od daty pierwszego otwarcia

