

IBUPROM MAX RAPID 400 mg 12 tabletek



Cena: 10,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka	400 mg
Opakowanie	12 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Ibuprofenum





Opis produktu

WskazaniaLek Ibuprom Max Rapid jest przeznaczony do stosowania w następujących przypadkach:Ostre bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego:- bóle głowymigrena z aurą lub bez (wraz z objawami dodatkowymi, takimi jak nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk);napięciowe bóle głowy;- bóle zębów;- bóle mięśniowe, stawowe i kostne;- bolesne miesiączkowanie;- nerwobóle;- bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu.Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).Substancja czynna: Ibuprofenum**Działanie**Ibuprom Max Rapid zawiera 400 mg ibuprofenu w postaci 512 mg ibuprofenu sodowego dwuwodnego. Ibuprofen należy do leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), mających właściwości przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek do krótkotrwałego stosowania.Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego, u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku co najmniej 12 lat.Zazwyczaj stosuje się następujące dawkowanie:Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletkę co cztery godziny. Tabletki popijać wodą. Nie stosować więcej niż 3 tabletki w ciągu doby.Pacjenci w podeszłym wieku: u osób w podeszłym wieku istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Można je zminimalizować stosując najmniejsze skuteczne dawki przez jak najkrótszy okres.**Ważne**Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Jeśli w przebiegu zakażenia jego objawy (takie jak gorączka i ból) utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.**Skład**Substancją czynną leku jest ibuprofen – 1 tabletką powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu w postaci 512 mg ibuprofenu sodowego dwuwodnego.Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna (200M), sodu laurylosiarczan, krospowidon, powidon (K-30), krzemionka, koloidalna uwodniona, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian; Otoczka (Opadry fx 64F580006): hypromeloza 2910, laktoza jednowodna, makrogol (E1521), potasowo-glinowy krzemian (E 555) / tytanu dwutlenek (E 171), talk, tytanu dwutlenek (E171), sodu cytrynian. Tusz Opacode Monogramming Ink S-1-175005 Grey: szelak, alkohol izopropylowy, tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna, lak (E 132), żółcień pomarańczowa, lak (E 110), czerwień Allura AC, lak (E 129), glikol propylenowy (E 1520), alkohol n-butyłowy, amonu wodorotlenek

Galeria

IBUPROM MAX RAPID
ZWALCZA 10 OSTRYCH BÓLI

-  BÓLE GŁOWY, W TYM MIGRENA I BÓLE NAPIĘCIOWE
-  BÓLE MIĘŚNI, STAWÓW I KOŚCI
-  BÓLE W PRZEZIĘBIENIU I GRYPIE
-  BÓLE ZĘBÓW
-  BÓL MENSTRUACYJNY
-  NERWOBÓLE

IBUPROM MAX RAPID

INFORMACJE O LEKU

SKŁAD
1 tabletką powlekana zawiera: 400 mg ibuprofenu w szybszej postaci 512 mg ibuprofenu sodowego dwuwodnego.

PRZECHOWYWANIE
Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania. Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

OSTRZEŻENIA
Nie stosować z innymi lekami zawierającymi ibuprofen.

IBUPROM MAX RAPID

DAWKOWANIE

DOROŚLI I DZIECI 12+ LAT

1 TABLETKA CO 4 GODZINY (MAKSYMALNIE 3 TABLETKI NA DOBĘ)

IBUPROM MAX RAPID

NAJSZYBSZY NA OSTRY BÓL
Z NOWĄ FORMUŁĄ SZYBKIEGO WCHŁANIANIA



IBUPROM MAX RAPID