IBURAPID 400 mg 50 tabletek Nord Farm

Cena: 18,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,4 g
Opakowanie	50 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	NORD FARM SP.Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

WskazaniaIburapid stosowany jest w następujących przypadkach: bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (bóle głowy, m.in. ból napięciowy i migrena, bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu), gorączka różnego pochodzenia (m.io. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych), bolesne miesiączkowanie.**Działanie**Ibuprofen należy do grupy leków - niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), o działaniu leczniczym: przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farrmaceuty.Występowanie działań niepożądanych można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy okres, konieczny do opanowania objawów.Dorośli i młodzież (w wieku od 12 lat) o masie ciała 40 kg i większej: Dawka początkowa ibuprofenu to 400 mg (1 tabletka). W razie konieczności można przyjąć dodatkową dawkę 400 mg Ibuprofenu (1 tabletka). Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien być ustalany odpowiednio do występujących objawów i przy uwzględnieniu maksymalnej zalecanej dawki dobowej. Nie powinien być on krótszy niż 6 godzin. W ciągu 24 godzin nie należy przekraczać całkowitej dawki 1200 mg Ibuprofenu (3 tabletki).Dawkowanie w przypadku migrenowego bólu głowy to 400 mg (1 tabletka) w dawce pojedynczej, a w razie konieczności 400 mg (1 tabletka) co 4 - 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa Ibuprofenu nie powinna przekraczać 1200 mg (3 tabletki). Przyjmowanie leku należy ograniczyć do maksymalnie dwóch lub trzech dni w tygodniu.Sposób podawania:Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie leku Iburapid podczas posiłków.Pacjenci w wieku powyżej 65 lat: Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku powinien zawsze skonsultować się z lekarzem zanim zacznie stosowanie leku Iburapid, ze względu na większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych, lekarz zalecić odpowiednie stosowanie leku.Zaburzenia czynności wątroby i nerek: Jeśli pacjent choruje z powodu zmniejszonej czynności nerek lub wątroby, należy zawsze skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Iburapid. lekarz zaleci odpowiednie stosowanie leku.W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.**Ważne**Przeciwwskazania:Nie stosować leku Iburapid: jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku jeśli pacjent ma uczulenie na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy lub na inne substancje; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego (choroby skóry i błon I śluzowych charakteryzujące się występowaniem obrzęków), skurczu oskrzeli, nieżytu nosa (kataru) lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ, jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby, w przypadku choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy (czynnej lub w wywiadzie), perforacji lub krwawienia, również występującego po zastosowaniu NLPZ, w ciężkiej niewydolności serca (klasa IV wg

NYHA), jeśli u pacjenta występuje ciężkie nadciśnienie tętnicze, jeśli u pacjenta występuje krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie, jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego, jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym nawodnieniem), w przypadku skazy krwotocznej (skłonności do krwawień w obrębie np. skóry i błon śluzowych, nosa, układu pokarmowego) oraz przyjmowania leków przeciwzakrzepowych, w przypadku jednoczesnego przyjmowania innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2,**Skład**Substancją czynną leku jest Ibuprofen (Ibuprofenum) - 400 mg.Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza Jednowodna, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, powidon K30, talk, dimetykon, krzemionka koloidalna bezwodna.Otoczka tabletki: talk, łiypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, czerwień koszenilowa (£ 124), azorabina (E 122), dimetykon.Opakowanie:50 tabletek