


## IBUVIT D3 KIDS krople doustne 15000 IU 10 ml



Cena: 18,25 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	15 000 I.U./ml
Opakowanie	10 ml
Postać	krop.doust., roztw.
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Vitaminum D

### Opis produktu

**Wskazania**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.**Działanie**Lek Ibuvit D3 Kids zawiera jako substancję czynną cholekalcyferol (witaminę D3).Witamina D3 znajduje się w niektórych produktach spożywczych, jest również wytwarzana w organizmie, gdy skóra jest ekspozowana na promieniowanie słoneczne.Witamina D3 zwiększa wchłanianie wapnia z jelit i zmniejsza jego wydalanie przez nerki, co wspomaga budowę kości, utrzymanie właściwego napięcia mięśni, pobudzenia nerwowego i krzepnięcia krwi. Niedobór witaminy D3 jest przyczyną między innymi krzywicy (zaburzonej mineralizacji kości u dzieci).Witamina D3 odgrywa zasadniczą rolę także we wchłanianiu fosforanów z jelit, transporcie soli mineralnych oraz uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Uwaga: 1 kropla zawiera około 500 IU witaminy D3. Skrót IU (ang. International Unit) oznacza jednostkę międzynarodową, którą oznacza się aktywność witaminy D.Profilaktyka niedoborom witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy DU pacjentów z prawidłową masą ciała, w miesiącach od października do kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich (patrz punkt 1.).Noworodki i niemowlęta (do ukończenia 1. roku życia)• 500 IU (1 kropla)U noworodków i niemowląt lek powinien być stosowany pod kontrolą lekarza.Dzieci w wieku od 1 do 4 lat• 500 IU (1 kropla)Dzieci w wieku od 4 do 10 lat• 500 - 1000 IU (1 - 2 krople)Młodzież (w wieku od 11 do 18 lat)• 1000 - 2000 IU (2 - 4 krople)Dorośli• 1000 - 2000 IU (2 - 4 krople)Pacjenci w podeszłym wieku• w wieku od 65 do 75 lat: 1000 - 2000 IU (2 - 4 krople)• w wieku powyżej 75 lat: 2000 IU - 4000 IU (4 - 8 kropli)Dorośli z otyłością oraz dzieci i młodzież z nadwagąDorośli z otyłością (wskaźnik masy ciała ang. body mass index, BMI $\geq$ 30) oraz dzieci i młodzież z nadwagą (wskaźnik masy ciała ang. body mass index, BMI >90-tego centyla odpowiedniego dla wieku i płci) wymagają podwojonej dawki witaminy D względem dawki rekomendowanej rówieśnikom o prawidłowej masie ciała.Profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzem:Zazwyczaj zalecana dawka to 2000 IU (4 krople) na dobę, niezależnie od pory roku, chyba że lekarz zaleci inny sposób dawkowania.W czasie ciąży kobiety powinny stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego, ponieważ ich zapotrzebowanie na witaminę D może różnić się w zależności od zasobów ustrojowych witaminy D.Nie należy stosować leku dłużej niż zalecane lub w większych dawkach, jak również nie należy stosować jednocześnie innych leków,

suplementów diety ani innego rodzaju środków spożywczych zawierających witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriol lub inne metabolity i analogi witaminy D bez porozumienia z lekarzem. Lekarz może zalecić pomiar stężenia 25(OH)D w surowicy. Sposób podawania Podanie doustne. W celu łatwiejszego odmierzenia kropli, butelkę należy trzymać pionowo. Lek Ibuvit D3 Kids najlepiej przyjmować podczas posiłku. Leku Ibuvit D3 Kids nie należy mieszać z mlekiem w butelce ani z pokarmami miękkimi w pojemnikach, gdyż jeśli dziecko nie spożyje całej porcji, nie otrzyma ono pełnej dawki leku. Należy zapewnić przyjęcie całej dawki leku. Z uwagi na ryzyko przedawkowania, nie należy podawać leku bezpośrednio z butelki do ust dziecka. Roztwór powinien być dozowany na łyżeczkę. **Ważne.** Możliwe działania niepożądane Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane praktycznie nie występują po podawaniu w zalecanych dawkach. W przypadku rzadko występującej nadwrażliwości na witaminę D lub po stosowaniu zbyt dużych dawek przez dłuższy czas, może dojść do zatrucia określanego jako hiperwitaminoza D. Objawy hiperwitaminozy obejmują: • zaburzenia rytmu serca; • bóle głowy, letarg; • zapalenie spojówek, światłowstręt; • utratę łaknienia, nudności, wymioty, zaparcia; • mocznicę, wielomocz; • bóle mięśni i stawów, osłabienie mięśniowe; • hipercholesterolemię, ubytek masy ciała, nadmierne pragnienie, obfite pocenie, zapalenie trzustki; • nadciśnienie tętnicze; • świąd skóry; • podwyższoną aktywność aminotransferaz; • obniżone libido, depresję, zaburzenia psychiczne; • wodnisty wyciek z nosa; • hipertermię; • suchość w jamie ustnej; • zwiększenie stężenia wapnia we krwi i (lub) w moczu; • kamicę nerkową; • zwapnienia tkanek. Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl> Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku. **Skład** Co zawiera lek Ibuvit D3 Kids: Substancją czynną leku jest cholekalcyferol. Każdy ml (około 30 kropli) roztworu zawiera 15 000 IU cholekalcyferolu. Każda kropla zawiera około 500 IU witaminy D3. Pozostały składnik to: triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha. Jak wygląda lek Ibuvit D3 Kids i co zawiera opakowanie Ibuvit D3 Kids ma postać przezroczystego, bezbarwnego do jasnożółtego roztworu. Opakowanie zawiera butelkę o pojemności 10 ml, z oranżowego szkła typu III, zamkniętą zakrętką z HDPE z kroplomierzem z LDPE, w tekturowym pudełku.