

INALDIN GARDŁO 3 mg 20 tabletek do ssania DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024

Cena: 2,90 PLN



Opis słownikowy

Dawka	3 mg
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.do ssania
Producent	BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Benzydaminum

Opis produktu

Opis

Poznaj Inaldin Gardło

Dla kogo Inaldin Gardło?

Jak stosować Inaldin Gardło?

Szczegóły produktu Inaldin Gardło

Poznaj

Inaldin Gardło jest stosowany w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

Dla kogo ?

Inaldin Gardło to tabletki do ssania do stosowania na ból gardła dla osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej.

działa znieczulająco

zwalcza ból

leczy stan zapalny

Jak stosować ?

* Tabletki należy ssać. Nie należy ich rozgryzać ani połykać.

Leczenie nie powinno przekraczać 7 dni.

Pozostałe produkty

Inaldin Gardło MAX aerozol

Na ostry ból gardła dla osób dorosłych

INALDIN Gardło MAX, 3 mg/ml. Skład: Jedna dawka aerozolu (0,17 ml) zawiera 510 mcg benzydamininy chlorowodorku (Benzydaminini hydrochloridum). Postać farmaceutyczna: aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. Wskazania do stosowania: Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła lub podrażnień błony śluzowej jamy ustnej lub gardła. INALDIN Gardło MAX jest wskazany do stosowania u osób dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24PPT3, Irlandia.

Inaldin Gardło aerozol

Na ból gardła dla dzieci i dorosłych

INALDIN Gardło, 1,5 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. Skład: Jedna dawka aerozolu (0,17 ml) zawiera 255 mcg benzydamininy chlorowodorku (Benzydaminini hydrochloridum). Postać farmaceutyczna: aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. Wskazania do stosowania: Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła. Podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24PPT3, Irlandia.

Szczegóły produktu

Skład

Stosowanie

Opakowanie

Inne informacje

INALDIN Gardło, 3 mg, tabletki do ssania. Skład: każda tabletki do ssania zawiera 3 mg benzydaminę chlorowodoru (Benzydaminę hydrochloridum), co odpowiada 2,68 mg benzydaminę.

Wielkość opakowania: 20 tabletek (2 blistry po 10 tabletek do ssania).

ChI-PL-2211-029

TO JEST LEK. DLA BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ GO ZGODNIE Z ULOTKĄ DOŁĄCZONĄ DO OPAKOWANIA. NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEJ DAWKI LEKU. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.

WskazaniaINALDIN GARDŁO 3 mg 20 tabletek do ssaniaINALDIN Gardło jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.**Działanie**INALDIN Gardło jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła. Działa miejscowo przeciwzapalnie i przeciwbólowo oraz znieczulająco na błonę śluzową jamy ustnej, przynosząc szybką ulgę.**Sposób użycia**Dawkowanie:Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 1 tabletki do ssania 3 razy na dobę.Dzieci w wieku 6 lat i powyżej: dawkowanie jak u osób dorosłych.Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego INALDIN Gardło w postaci tabletek do ssania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.Leczenie nie może przekraczać 7 dni.Sposób podawania:INALDIN Gardło jest przeznaczony do stosowania na śluzówkę jamy ustnej.Tabletki należy ssać. Nie należy ich rozgryzać ani połykać.**Ważne**U niewielu pacjentów może wystąpić owrzodzenie policzków lub gardła spowodowane przez ciężką chorobę. Dlatego pacjenci, u których objawy nasilą się lub nie ustąpią w ciągu 3 dni, lub u których wystąpi gorączka albo inne objawy, muszą zasięgnąć odpowiedniej porady lekarza lub dentystry.Długotrwałe stosowanie leku może wywoływać reakcje alergiczne. Jeśli to nastąpi, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego i skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniej terapii.Nie zaleca się stosowania benzydaminę w przypadku nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową lub chorobami alergicznymi w wywiadzie, ponieważ u tych osób może wystąpić skurcz oskrzeli.Ten produkt leczniczy zawiera 7 mg aspartamu w każdej tabletki do ssania. Aspartam jest źródłem fenylealaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenylketonurią.Brak klinicznych i nieklinicznych danych dotyczących stosowania aspartamu u niemowląt w wieku poniżej 12 tygodni.**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą**SkładKażda tabletki do ssania zawiera 3 mg benzydaminę chlorowodoru (Benzydaminę hydrochloridum), co odpowiada 2,68 mg benzydaminę.Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletki do ssania zawiera 7 mg aspartamu (E 951).Postać farmaceutyczna: Tabletki do ssania. Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki barwy zielonej, o marmurkowej powierzchni i zapachu mięty, o średnicy około 13 mm.

Galeria

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

Grupa wiekowa	Dawkowanie	Frekwencja
Dzieci w wieku 6 lat i powyżej	1 tabletki	3 razy na dobę
Dorośli	1 tabletki	3 razy na dobę

INALDIN Gardło, 3 mg, tabletki do ssania, każda tabletki zawiera 3 mg benzydaminę chlorowodoru (benzydaminę hydrochloridum), co odpowiada 2,68 mg benzydaminę. Produkt farmaceutyczny. Składnik pomocniczy: aspartam (E 951).
Leczenie nie może przekraczać 7 dni.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

POTRÓJNE DZIAŁANIE W WALCIE Z BÓLEM GARDŁA

INALDIN Gardło, 3 mg, tabletki do ssania, każda tabletki zawiera 3 mg benzydaminę chlorowodoru (benzydaminę hydrochloridum), co odpowiada 2,68 mg benzydaminę. Produkt farmaceutyczny. Składnik pomocniczy: aspartam (E 951).
Leczenie nie może przekraczać 7 dni.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

DZIAŁA ZNIECZULAJĄCO
ZWALCZA BÓL
LECZY STAN ZAPALNY

INALDIN Gardło, 3 mg, tabletki do ssania, każda tabletki zawiera 3 mg benzydaminę chlorowodoru (benzydaminę hydrochloridum), co odpowiada 2,68 mg benzydaminę. Produkt farmaceutyczny. Składnik pomocniczy: aspartam (E 951).
Leczenie nie może przekraczać 7 dni.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.