

INALDIN GARDŁO MAX 3 mg/ml aerozol do stosowania w jamie ustnej 30 ml

Cena: 16,95 PLN



Opis słownikowy

Dawka	3 mg/ml
Opakowanie	30 ml
Postać	aer.do stos.w j.ust., roztw.
Producent	BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Benzydaminum

Opis produktu

Opis

Poznaj Inaldin Gardło MAX

Dla kogo Inaldin Gardło MAX?

Jak stosować Inaldin Gardło MAX?

Szczegóły produktu Inaldin Gardło MAX

Poznaj

Inaldin Gardło MAX jest stosowany w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła lub podrażnień błony śluzowej jamy ustnej lub gardła.

Dla kogo ?

Inaldin Gardło MAX to aerozol do stosowania w jamie ustnej na ostry ból gardła dla dorosłych.

działa znieczulająco

zwalcza ból

leczy stan zapalny

Jak stosować ?

u osób dorosłych

od 2 do 4 dawek każdorazowo

2-6 razy na dobę*

Nie częściej niż co 1,5-3 godz. Jedno naciśnięcie pompki dozującej dostarcza jedną dawkę aerozolu. Należy przyjmować po posiłku lub po spożyciu napoju.

Leczenie nie powinno przekraczać 7 dni.

Pozostałe produkty

Inaldin Gardło tabletki

Na ból gardła dla osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej

INALDIN Gardło, 3 mg, tabletki do ssania. Skład: każda tabletki zawiera 3 mg benzydaminu chlorowodoru (Benzydaminu hydrochloridum), co odpowiada 2,68 mg benzydaminu. Postać farmaceutyczna: tabletki do ssania. Wskazania do stosowania: INALDIN Gardło jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła. Podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24PPT3, Irlandia.

Inaldin Gardło aerozol

Na ból gardła dla dzieci i dorosłych

INALDIN Gardło, 1,5 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. Skład: Jedna dawka aerozolu (0,17 ml) zawiera 255 mcg benzydaminu chlorowodoru (Benzydaminu hydrochloridum). Postać farmaceutyczna: aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. Wskazania do stosowania: Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła. Podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24PPT3, Irlandia.

Szczegóły produktu

Skład

Stosowanie

Opakowanie

Inne informacje

INALDIN Gardło MAX, 3 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. Skład: jeden mililitr produktu zawiera 3 mg benzydaminę chlorowodoru, co odpowiada 2,68 mg benzydaminę. Każda dawka produktu (0,17 ml) zawiera 510 mikrogramów benzydaminę chlorowodoru, co odpowiada 456 mikrogramom benzydaminę.

Postać: aerozol Wielkość opakowania: 30 ml, 3 mg/ml Ilość dawek: 150 Okres ważności: 3 lata Okres ważności po pierwszym użyciu: 160 dni Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

ChI-PL-2211-029

TO JEST LEK. DLA BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ GO ZGODNIE Z ULOTKĄ DOŁĄCZONĄ DO OPAKOWANIA. NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEJ DAWKI LEKU. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.

WłaściwościINALDIN GARDŁO MAX 3 mg/ml aerozol do stosowania w jamie ustnej 30 mlINALDIN Gardło MAX jest stosowany u dorosłych w leczeniu objawów związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła (ból, zaczerwienienie, obrzęk) lub podrażnieniami błony śluzowej jamy ustnej lub gardła.**Zalecane spożycie**Dorośli:Lek jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych.Zalecana dawka to każdorazowo od 2 do 4 dawek (rozpyleń) aerozolu, od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5 – 3 godziny. Jedno naciśnięcie pompki dozującej (urządzenie pomiarowe) dostarcza jedną dawkę aerozolu.Nie należy przekraczać zalecanej dawki.Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 7 dni, o ile lekarz nie zdecyduje inaczej. Jeśli objawy nie ustępują lub pacjent czuje się gorzej po 3 dniach, jeśli wystąpi gorączka lub inne objawy, należy skontaktować się z lekarzem.Dzieci i młodzież:Lek ten nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).**Ważne**Przeciwwskazania / Kiedy nie stosować leku INALDIN Gardło?Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**Składniki**3 mg/ml benzydaminę chlorowodoru (Benzydaminę hydrochloridum)**Producent**Podmiot odpowiedzialny:Bausch Health Ireland Limited3013 Lake DriveCitywest Business CampusDublin 24, D24PPT3IrlandiaWytwórca:ICN Polfa Rzeszów S.A.Ul. Przemysłowa 235 – 959 RzeszówPrzedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:Bausch Health Poland sp. z o.o.Ul. Przemysłowa 235 – 959 Rzeszów

