

INUPRIN syrop 0,05 g/ml 150 ml

Cena: 15,89 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,05 g/ml
Opakowanie	150 ml
Postać	syrop
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Inosinum pranobexum

Opis produktu

Wskazania INUPRIN syrop 0,05 g/ml 150 ml Inuprin jest lekiem w postaci syropu, który zawiera jako substancję czynną inozyny pranobeks. Wykazuje on działanie przeciwwirusowe i pobudzające czynność układu odpornościowego. Syrop Inuprin przeznaczony jest dla dzieci powyżej 1 roku życia oraz osób dorosłych. Jeśli po upływie 5 do 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. **Działanie** Lek Inuprin jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia: wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). **Substancja czynna:** Inosinum pranobexum **Sposób użycia** Zalecana dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta. Dawka dobową powinna być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę. **Dorośli**, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): Zalecana dawka dobową wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę), zwykle 3 g (czyli 60 ml syropu) na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeksu na dobę (czyli 80 ml syropu na dobę). Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 80 ml na dobę. **Dzieci powyżej 1 roku życia:** Zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby. Poniższa tabela przedstawia dawkowanie w zależności od masy ciała pacjenta: Masa ciała Dawkowanie na dobę 10-14 kg 3 x 5 ml syropu * 15-20 kg 3 x 5 do 7,5 ml syropu * 21-30 kg 3 x 7,5 do 10 ml syropu * 31-40 kg 3 x 10 do 15 ml syropu * 41-50 kg 3 x 15 do 17,5 ml syropu * **Ważne** Kiedy nie należy stosować leku Inuprin? jeśli pacjent ma uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, świąd, języka lub gardła. Jeśli u pacjenta występuje aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. **Skład** Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks. Pozostałe składniki to: sacharoza, glicerol (E422), glikol propylenowy (E1520), metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), aromat malinowy AR0616/G: substancje aromatyczne, preparat aromatyczny, glikol propylenowy (E 1520), sodu wodorotlenek, kwas cytrynowy, woda oczyszczona.