


ITAMI 140 mg plaster leczniczy 10 plastrów na ból, urazy

Cena: 60,36 PLN



Opis słownikowy

Producent FIDIA FARMACEUTICI

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Wskazania ITAMI 140 mg plaster leczniczy 10 plastrów Leczenie krótkotrwałe (nie dłużej niż 7 dni). Miejscowe, krótkotrwałe i objawowe leczenie bólu u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat w przypadku ostrych nadwyrężeń, zwichnięć czy siniaków kończyn, powstałych w wyniku tępych urazów, np. urazów sportowych. **Działanie** ITAMI® to plaster z diklofenakiem 140 mg, który łagodzi ból i stan zapalny bezpośrednio w miejscu zmienionym chorobowo. Plaster ITAMI® działa aż 12 godzin, zapewniając wygodę zastosowania. Jest cienki i elastyczny - bardzo dobrze przylega do skóry i nie odkleja się nawet w miejscach narażonych na ruch, np. stawy. **Sposób użycia** Zalecana dawka to jeden plaster leczniczy dwa razy na dobę. Plaster leczniczy należy nakładać na bolące miejsce dwa razy na dobę: rano i wieczorem. Maksymalna dawka to 2 plastry lecznicze na dobę, nawet jeśli leczony ma być więcej niż jeden obszar chorobowy. W danym czasie leczone może być wyłącznie jedno bolące miejsce. Stosowanie u dzieci i młodzieży Lek Itami jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat. Brak wystarczającej ilości danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat. W przypadku młodzieży w wieku powyżej 16 lat, jeśli stosowanie niniejszego leku jest wymagane dłużej niż 7 dni, bądź jeśli objawy się nasila, zaleca się, aby pacjent lub jego opiekunowie skonsultowali się z lekarzem. **Ważne** Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL; u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u pacjentów, u których podczas przyjmowania kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ wystąpił atak astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt nosa; u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; stosowanie na uszkodzoną skórę, niezależnie od rodzaju zmiany: wysiękowe zapalenie skóry, wysypki, zmiany zakażone, oparzenia lub rany; ostatni trymestr ciąży. Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat. **SKŁAD** **Skład** Jeden plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego. Pozostałe składniki to: Metakrylanu butylu kopolimer zasadowy, Akrylanów kopolimer, Makrogolu 12, stearynian Sorbitanu oleinian, Poliesterowa warstwa nośna Papierowa monosilikonowa warstwa ochronna Dostępne opakowanie: Dostępne opakowania zawierające 2, 5 i 10 plastrów pakowanych w oddzielne saszetki.

Galeria

