

JONOLIT BABY proszek 10 saszetek



Cena: 10,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 sasz.
Postać	prosz.
Producent	OLEOFARM SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Diet. środ. specjal. przezn. med.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis Jonolit Baby to preparat do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu, w trakcie biegunki i/lub wymiotów dla niemowląt od 1. dnia życia oraz dzieci do 3. roku życia. Właściwości Jonolit Baby: Jonolit baby jest preparatem w postaci proszku do przygotowania doustnego płynu nawadniającego o zmniejszonej osmolarności i zawartości sodu, którego skład zgodny jest z zaleceniami ESPGHAN. W stanach odwodnienia organizmu, niezależnie od ich przyczyny, zaburzeniom ulega równowaga wodno-elektrolitowa. Konieczne jest wtedy uzupełnianie diety w glukozę i minerały podane w odpowiednich proporcjach. **Sposób użycia** Dawkowanie preparatu uzależnione jest od stopnia odwodnienia organizmu, etapu nawadniania oraz zaleceń lekarskich. Zgodnie z zaleceniami WHO/UNICEF: Faza nawadniania (pierwsze 4 godziny nawadniania) Faza nawadniania podtrzymującego (dalsze etapy nawadniania) Masa ciała poniżej 5 kg (wiek poniżej 4 miesięcy) zawartość 1 – 2 saszetek rozpuścić w 200 – 400 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml wody); podawać małymi porcjami zawartość 1 saszetki rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml; podawać 50-100ml (5-10 ml na kg masy ciała) płynu po każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; nie przekraczać 500ml dziennie Masa ciała 5 – 7,9 kg (wiek 4 – 11 miesięcy) zawartość 2 – 3 saszetek rozpuścić w 400 – 600 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml wody); podawać małymi porcjami zawartość 1 saszetki rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml; podawać 50-100ml (5-10 ml na kg masy ciała) płynu po każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; nie przekraczać 500ml dziennie Masa ciała 8 – 10,9 kg (wiek 12 – 23 miesięcy) zawartość 3 – 4 saszetek rozpuścić w 600 – 800 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml wody); podawać małymi porcjami zawartość 1 saszetki rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml; podawać 100 -200 ml płynu po każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; nie przekraczać 1000ml dziennie masa ciała 11-15,9 kg (wiek: 2-3 lata) zawartość 4 – 6 saszetek rozpuścić w 800 – 1200 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml wody); podawać małymi porcjami zawartość 1 saszetki rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml; podawać 100 -200 ml płynu po każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; nie przekraczać 1000ml dziennie Saszetkę należy otworzyć, a następnie jej zawartość rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody. Przed podaniem schłodzić. Roztwór powinien być podawany niemowlętom oraz dzieciom za pomocą czystej łyżeczki lub kubeczka. Niemowlętom oraz dzieciom do 2. roku życia wlewać roztwór małymi porcjami bezpośrednio do ust co 1-2 minut, starsze dzieci mogą popijać małymi łykami bezpośrednio z kubeczka. W przypadku wystąpienia wymiotów u dziecka, nawadnianie należy przerwać na 5–10 minut, a następnie rozpocząć podawanie płynu w wolniejszym tempie. Sporządzonego roztworu nie należy dosładzać. Płyn należy spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Roztwór nie nadaje się do spożycia po upływie 24 godzin po przygotowaniu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. **Skład** glukoza, cytrynian sodu, chlorek sodu,

chlorek potasu. Wartość odżywcza 100 g produktu w saszetkach 200 ml produktu sporządzonego zgodnie z instrukcją przygotowania: wartość energetyczna 1064 kJ / 304 kcal 48 kJ / 14 kcal tłuszcz, w tym: 0 g 0 g kwasy tłuszczowe nasycone 0 g 0 g węglowodany, w tym: 76 g 3,4 g cukry 73 g 3,2 g białko 0 g 0 g sól, z czego 14 g 0,6 g sól 6273 mg 276 mg 200 ml płynu przygotowanego zgodnie z instrukcją zawiera: 3,24 g glukozy, 379 mg cytrynianu, 355 mg chlorków, 276 mg sodu, 157 mg potasu. Osmolarność roztworu: 230 mOsm/l/