

Kendamil Płynne mleko początkowe dla niemowląt 1, 250ml



Cena: 14,88 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	250ml
Producent	Health Academy
Rodzaj rejestracji	Diet. środ. specjal. przezn. żyw.

Opis produktu

OpisKendamil Płynne mleko początkowe dla niemowląt

Karmienie piersią to najlepszy sposób żywienia niemowląt.

Kendamil 1, mleko początkowe w płynie (250 ml).

Mleko początkowe w płynie do bezpośredniego spożycia przeznaczone do żywienia niemowląt już od urodzenia. Sterylizowano metodą UHT. Pakowano w atmosferze ochronnej. DHA* roślinnego pochodzenia (*jak, zgodnie z przepisami, każda żywność dla niemowląt).

Sposób przygotowania:

Umyj ręce i wysterylizuj wszystkie akcesoria do karmienia zgodnie z instrukcjami producenta. Sprawdź minimalny okres przydatności do spożycia produktu, a następnie dobrze wstrząśnij butelką. Wlej wymaganą ilość mleka do wysterylizowanej butelki. Podawaj w temperaturze pokojowej lub w razie potrzeby mleko podgrzej. W takim przypadku przed podaniem należy sprawdzić temperaturę mleka.

Zalecane dawkowanie (od urodzenia do 12 m-ca życia)

Przybliżony wiek dziecka	1)	2)	3)
Od urodzenia do 2 tygodnia	3,5 kg	90 ml	6
2-4 tygodnia	3,9 kg	120 ml	5
4-8 tygodnia	4,7 kg	150 ml	5
8-12 tygodnia	5,4 kg	180 ml	5
3-4 miesiąca	6,2 kg	180 ml	5
4-5 miesiąca	6,9 kg	210 ml	5
5-6 miesiąca	7,6 kg	210 ml	5
7-12 miesiąca*	-	210 ml	3

1) = Przybliżona waga dziecka

2) = Ilość mleka w 1 dawce (ml)

3) = Liczba dawek (karmień) w ciągu 24 godzin.

* jako część zróżnicowanej i zbilansowanej diety

Wartość odżywcza	100 ml	
Wartość energetyczna	269/ 64	kJ / kcal
Tłuszcz	3,3	g
w tym		
- Kwasy tłuszczowe nasycone	0,8	
- Kwasy tłuszczowe wielonienasycone	0,6	g
- Kwas alfa-linolenowy	50	mg
- Kwas dokozaheksaenowy (DHA)	15	mg
- Kwas Linolowy	430	mg
- Kwas Arachidonowy (AA)	15	mg
Węglowodany	7	g
- w tym cukry	6,8	g
- w tym laktoza	6,8	g
Błonnik	0,68	g
- w tym galakto-oligosacharydy	0,61	g
- w tym frukto-oligosacharydy	0,07	g
Białko	1,3	g
- w tym białko serwatkowe	0,68	g
- w tym kazeina	0,62	g

Witaminy		
Witamina A	65	µg-RE
Witamina D3	1,5	µg
Witamina E	1,5	mg-α-TE
Witamina K1	4	µg
Witamina C	10	mg
Tiamina	0,055	mg
Ryboflawina	0,10	mg
Niacyna	0,49	mg
Witamina B6	0,043	mg
Foliany	16	µg DFE
Witamina B12	0,20	µg
Kwas pantotenowy	0,43	mg
Biotyna	1,8	µg

Składniki mineralne		
Sód	32	mg
Potas	78	mg
Chlorek	45	mg
Wapń	60	mg
Fosfor	43	mg
Magnez	4,60	mg

Żelazo	0,70	mg
Cynk	0,50	mg
Miedź	0,061	mg
Jod	13	µg
Selen	2,7	µg
Mangan	13	µg
Fluorek	<10	µg
Inne		
Tauryna	3	mg
Cholina	24	mg
Inozytol	6,2	mg
L-Karnityna	1,4	mg
Składniki:		

woda, pełnotłuste mleko 23%, demineralizowana serwatka (mleko), demineralizowany permeat serwatki (mleko), oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy), galaktooligosacharydy (mleko), fruktooligosacharydy, olej z mikroalg Schizochytrium sp., olej z Mortierella alpina, L-tryptofan, L-tyrozyna, L-histydyna, inozytol, L-karnityna, chlorek choliny, tauryna, składniki mineralne (cytrynian sodu, sole wapniowe kwasu cytrynowego, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, sole potasowe kwasu ortofosforowego, chlorek sodu, chlorek magnezu, siarczan żelaza(II), siarczan cynku, siarczan miedzi(II), siarczan manganu, selenian(IV) sodu, jodek potasu, wodorotlenek potasu), witaminy (witamina A, witamina D3, tiamina, witamina B2, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, biotyna, kwas foliowy, witamina B12, witamina C, witamina E, witamina K1), emulgator: lecytyna słonecznikowa, przeciwutleniacz: ekstrakt z wysoką zawartością tokoferoli.

Przechowywać w suchym miejscu w temp. 5–25 °C. Chronić przed światłem.

Najlepiej spożyć przed: patrz data na opakowaniu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i użyć do 24 godzin. Stopień napełnienia zależy od parametrów technologicznych.

Ważna uwaga: karmienie piersią to najlepszy sposób żywienia niemowląt. Produkt ten jest przeznaczony do karmienia niemowląt już od urodzenia, jeśli nie mogą być karmione piersią i powinien być stosowany wyłącznie za radą niezależnych osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia, farmacji lub innych specjalistów odpowiedzialnych za opiekę nad matką i dzieckiem. Podczas karmienia z butelki należy unikać niepotrzebnego przedłużania kontaktu smoczka z zębami, gdyż zwiększa to ryzyko wystąpienia próchnicy. Dbaj o higienę jamy ustnej dziecka w okresie wzrostu pierwszych ząbków, zwłaszcza przed snem. Nie podgrzewać mleka w mikrofalówce, aby uniknąć poparzenia. Podczas karmienia dziecka powinna być obecna odpowiedzialna osoba. Przestrzegać sposobu użytkowania dotyczącego przygotowania, karmienia i przechowywania, w przeciwnym razie zagrożisz zdrowiu dziecka.

Ostrzeżenie

Nie spożywać, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Niewłaściwe przechowywanie lub przygotowanie może pogorszyć stan produktu i zagrazić zdrowiu dziecka. Jeśli mleko podgrzewasz, przed karmieniem sprawdź na nadgarstku jego temperaturę. Nigdy nie przygotowuj butelki z mlekiem z wyprzedzeniem. Ze względów higienicznych niewykorzystane mleko należy natychmiast wyrzucić lub przechowywać je w lodówce i użyć w ciągu maks. 24 godzin.