

Kendamil Premium 1 Mleko początkowe, 800g



0-6



800 g

Cena: 66,30 PLN

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|---|
| Opakowanie | 800g |
| Producent | Health Academy |
| Rodzaj rejestracji | Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego |

Opis produktu

OpisKendamil Premium 1 Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt.

Mleko początkowe w proszku przeznaczone dla niemowląt już od urodzenia, jeśli nie mogą być karmione piersią. Mleko dla niemowląt Kendamil, którego podstawą jest wysokiej jakości pełnotłuste mleko krowie o naturalnej zawartości tłuszczu mlecznego. Jest przeznaczone dla dzieci od urodzenia do końca 6 miesiąca życia, jeśli nie mogą być karmione piersią. Opakowanie w pełni nadaje się do recyklingu.

Wyprodukowano z pełnotłustego mleka Bez oleju palmowego Bez oleju rybiego, bez soi Wyprodukowano bez użycia GMO (1) Przyjemny mleczny smak

(1) Certyfikowano. Zgodnie z prawem, na żadnym etapie produkcji, w tym karmienia zwierząt gospodarskich z których pozyskiwane jest mleko, nie użyto żadnych składników / surowców modyfikowanych genetycznie.

Przygotowanie:

Standardowy sposób przygotowania: 1 płaska miarka (4,3 g proszku) na 30 ml wody, co odpowiada 93 kJ (22 kcal). 100 ml KENDAMIL PREMIUM 1 = 90 ml przegotowanej wody + 3 płaskie miarki (12,9 g proszku).

Przed otwarciem wieczka należy zawsze sprawdzić, czy nie jest uszkodzony klips ochronny. Jeśli tak - nie używać. Usunięty klips ochronny i folię należy natychmiast wyrzucić, aby były poza zasięgiem dzieci. Umyć ręce, wysterylizować wszystkie akcesoria i butelkę. Zagotować wodę dla niemowląt i ostudzić ją do ok. 40°C. Nie należy używać już raz przegotowanej wody. Do butelki z wodą dodać odpowiednią liczbę płaskich miarek (patrz zalecane dawkowanie). Miarka dołączona jest do opakowania. Zakręcić butelkę i dobrze wstrząsnąć, aby proszek się rozpuścił. Zdjąć nasadkę i zastąpić ją wysterylizowanym smoczkiem. Przed podaniem sprawdzić temperaturę mleka na wewnętrznej stronie nadgarstka (zalecana temperatura to 37°C) i podawać.

Zalecane dawkowanie:

1 płaska miarka = 4,3 g proszku na 30 ml wody. Zalecane dawkowanie służy jedynie jako pomoc. Każde dziecko jest inne i może wymagać mniejszej lub większej porcji, niż podano poniżej. W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem. Dawkowanie dla dzieci od urodzenia do 1 tygodnia życia i wadze 3 kg: 90 ml wody na 1 porcję, stosując 3 miarki na 1 porcję.

| Wiek dziecka | Waga dziecka | Ilość wody/dawka | Liczba miarek/dawka | Liczba miarek/24 h |
|--------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 1. tygodnia | 3 kg | 90 ml | 3 | 6 |
| 1-4 tygodnia | 3.5 kg | 120 ml | 4 | 5 |
| 1-2 miesiąca | 4.5 kg | 120 ml | 4 | 5 |
| 3 miesiące | 5.5 kg | 150 ml | 5 | 5 |
| 4-5 miesiąca | 6.5 kg | 180 ml | 6 | 5 |
| 6 miesięcy | 8 kg | 210 ml | 7 | 4 |

Składniki:

pełnotłuste MLEKO (107 g płynnego MLEKA na 100 g proszku), demineralizowane białko serwatkowe (z MLEKA), oleje roślinne (słonecznikowy, kokosowy, rzepakowy), laktoza (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, galaktooligosacharydy (z MLEKA), koncentrat białka serwatkowego wzbogacony o alfa-laktoalbuminę (z MLEKA), chlorek potasu, cytrynian sodu, diwinian choliny, sole wapniowe kwasu cytrynowego, fruktooligosacharydy, chlorek magnezu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, mleczan wapnia, olej z mikroalg Schizochytrium sp., L-askorbinian sodu, wodorotlenek potasu, inozytol, L-tyrozyna, olej z Mortierella alpina, tauryna, nukleotydy (5'-monofosforan cytydyny, sól disodowa urydyny-5'-monofosforanu, 5'-monofosforan adenozyliny, sól disodowa 5'-monofosforanu inozyliny, sól disodowa 5'-monofosforanu guanozyliny), L-fenylalanina, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, witamina E, niacyna, D-pantotenian wapnia, siarczan miedzi (II), tiamina, ryboflawina, witamina A, witamina B6, siarczan manganu, kwas foliowy, jodek potasu, selenian (IV) sodu, witamina K, witamina D3, biotyna, witamina B12, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. Alergeny oznaczone są DUŻYMI LITERAMI. Skład odnosi się do suchej postaci produktu.

| Wartość energetyczna | kJ/kcal | 2170/520 | 280/67 |
|-------------------------------------|---------|----------|--------|
| Tłuszcz | g | 28 | 3,6 |
| - nasycone kwasy tłuszczowe | g | 9 | 1,2 |
| - wielonienasycone kwasy tłuszczowe | g | 6 | 0,8 |
| - kwas alfa linolenowy (ALA) | mg | 390 | 50 |
| - kwas dokozaheksaenowy (DHA) | mg | 125 | 16,1 |
| - kwas linolowy (LA) | mg | 4200 | 542 |
| - kwas arachidonowy (ARA) | mg | 62 | 8 |
| Węglowodany | g | 56 | 7,2 |
| - w tym cukry | g | 53 | 6,8 |
| - w tym laktoza | g | 51 | 6,6 |
| Błonnik | g | 2,1 | 0,27 |
| - GOS (galaktooligosacharydy) | g | 1,8 | 0,23 |
| - FOS (fruktooligosacharydy) | g | 0,2 | 0,03 |
| - 3'GL* | g | 0,1 | 0,01 |
| Białko (N x 6.25) | g | 10,1 | 1,3 |
| - białko serwatkowe | g | 6,1 | 0,8 |

| | | | |
|------------------|----------|------|--------|
| - kazeina | g | 4 | 0,5 |
| Witaminy | | | |
| Witamina A | µg-RE | 405 | 52 |
| Witamina D3 | µg | 10,5 | 1,35 |
| Witamina E | mg-α-TE | 15 | 1,9 |
| Witamina K | µg | 30 | 3,9 |
| Witamina C | mg | 81 | 10,4 |
| Tiamina | mg | 0,45 | 0,06 |
| Ryboflawina | mg | 1 | 0,13 |
| Niacyna | mg | 4,5 | 0,58 |
| Witamina B6 | mg | 0,37 | 0,05 |
| Folian | µg (DFE) | 120 | 15 |
| Witamina B12 | µg | 0,8 | 0,1 |
| Kwas pantotenowy | mg | 3,3 | 0,42 |
| Biotyna | µg | 20 | 2,6 |
| Minerały | | | |
| Sód | mg | 160 | 21 |
| Potas | mg | 550 | 71 |
| Chlorki | mg | 350 | 45 |
| Wapń | mg | 340 | 44 |
| Fosfor | mg | 214 | 28 |
| Magnez | mg | 47 | 6,1 |
| Żelazo | mg | 5,1 | 0,66 |
| Cynk | mg | 3,5 | 0,45 |
| Miedź | mg | 0,37 | 0,05 |
| Jod | µg | 90 | 12 |
| Selen | µg | 17 | 2,2 |
| Mangan | µg | 54 | 7 |
| Fluorki | mg | <0,1 | <0,015 |
| Pozostałe | | | |
| Tauryna | mg | 45 | 5,8 |
| Cholina | mg | 170 | 22 |
| Inozytol | mg | 100 | 13 |
| L-karnityna | mg | 6,8 | 0,9 |
| Nukleotydy | mg | 22 | 2,8 |

Uwaga:

Mleko początkowe Kendamil Premium 1 DHA+ jest odpowiednie dla niemowląt już od urodzenia, jeśli nie mogą one być karmione piersią i powinno być stosowane wyłącznie za radą niezależnych osób wykwalifikowanych w dziedzinie medycyny, żywienia, farmacji lub innych specjalistów odpowiedzialnych za opiekę nad matką i dzieckiem. Należy dbać o higienę jamy ustnej dziecka w okresie wyrastania pierwszych zębów, zwłaszcza przed snem. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przygotowania, karmienia i przechowywania, w przeciwnym razie można zagrozić zdrowiu niemowlęcia.

Ważne zalecenie:

Po przygotowaniu każdej porcji opakowanie należy dokładnie zamknąć. Nie należy dodawać mniejszej lub większej liczby miarek, niż podano, ani czegokolwiek innego. Przygotowaną potrawę należy zużyć w ciągu 2 godzin, następnie wyrzucić. Nie podgrzewać w mikrofalówce - ryzyko poparzenia dziecka.

Masa netto: 800g

Dystrybutor:

Health Academy s. R. O.Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Prague 5

Galeria

