

KETONAL SPRINT 25 mg granulat do przygotowania roztworu doustnego 12 saszetek



Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,025 g
Opakowanie	12 sasz.
Postać	gran.do p.roztw.doust.
Producent	SANDOZ GMBH
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Ketoprofenum

Opis produktu

WskazaniaLek bez recepty Ketonal Sprint stosuje się w krótkotrwałym, objawowym leczeniu lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia. Ketonal Sprint polecany jest między innymi w leczeniu bólu zęba, bólu menstruacyjnego oraz bólu głowy. Może być również stosowany w leczeniu bólu spowodowanego kontuzją, np. zwichnięciem lub skręceniem, a także w bólu zęba.Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży od 16 roku życia.**Działanie**Ketonal Sprint to lek z grupy NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym dostępny bez recepty. Ketonal Sprint ma postać niewielkich saszetek z granulem i jest przeznaczony do sporządzania roztworu doustnego. Substancją czynną leku przeciwbólowego Ketonal Sprint jest ketoprofen, który w połączeniu z lizyną działa jeszcze szybciej* na ból o różnym podłożu.Ketonal Sprint jest polecany m.in. w przypadku: bólu głowy oraz bólu zębów. Może być także stosowany w przypadku bólu menstruacyjnego. Dzięki temu, że działa jeszcze szybciej,* jest również dobrym sposobem na ból po urazach i kontuzjach.* W porównaniu z ketoprofenem w formie kwasowej.**Sposób użycia**Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z ulotką dla pacjenta dołączoną do leku. Lek stosuj zawsze zgodnie z ulotką lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przyjmowania lub dawkowania, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.Stosuj najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów.Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, stosuj maksymalnie 1 dawkę (saszetkę) 3 razy na dobę (co 8 godzin) podczas posiłków. Wysyp granulat z saszetki do szklanki z wodą, przyjmując ok. 50 ml wody na jedną saszetkę. Mieszaj aż do całkowitego rozpuszczenia granulatu (ok. 30 sekund). Wypij natychmiast po przygotowaniu.**Ważne**WażneKiedy nie stosować leku przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ketonal Sprint:u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 roku życia;jeśli pacjent ma uczulenie na ketoprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ketonal Sprint;jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja alergiczna po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub leku przeciwbólowego, np. ketoprofenu, ibuprofenu, diklofenaku, meloksykamu lub innych NLPZ, taka jak: napad astmy, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, pokrzywka, świąd nosa i wodnisty wyciek z nosa, innego rodzaju reakcje alergiczne;U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem ciężkie reakcje alergiczne.jeśli pacjent chorował na astmę;jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy albo występowało u niego w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego;jeśli pacjent ma chorobę przewodu pokarmowego, taką jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna;jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek;jeśli pacjent ma skłonność do krwawień;jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży.Ostrzeżenia i środki ostrożnościPrzed zastosowaniem leku Ketonal Sprint należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą,

jeśli: pacjent ma długotrwałe zapalenie błony śluzowej nosa lub zatok i (lub) polipy nosa; pacjent ma lub miał chorobę serca, taką jak łagodna lub umiarkowana zastoinowa niewydolność serca; jest poddawany lub przebył w przeszłości zabieg pomostowania tętnic wieńcowych; ma łagodną lub umiarkowaną chorobę nerek lub wątroby, w tym zmiany wartości wyników pewnych badań czynności wątroby lub nerek; ma lub miał wysokie ciśnienie krwi; ma choroby naczyń krwionośnych w rękach i (lub) nogach albo w mózgu; choruje na cukrzycę lub ma duże stężenie cholesterolu we krwi; ma zakażenie; pali tytoń; jest w podeszłym wieku. Ciąża i karmienie piersią Nie należy stosować leku Ketonal Sprint w ostatnich 3 miesiącach ciąży. Nie należy stosować leku Ketonal Sprint w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Ketonal Sprint. Nie wiadomo, czy ketoprofen przenika do mleka kobiecego. **Skład** Substancją czynną leku z grupy NLPZ bez recepty Ketonal Sprint jest ketoprofen. Każda saszetka zawiera 25 mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną (40 mg). Pozostałe składniki to: mannitol (E 421), powidon K30, aromat miętowy (zawiera maltodekstrynę i gumę arabską), sodu chlorek, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna.