

## KOLZYM krople doustne 15 ml



Cena: 22,20 PLN

### Opis słownikowy

Producent	SOLINEA
Rodzaj rejestracji	Suplement diety

### Opis produktu

#### Opis

KOLZYM krople doustne 15 ml

Kolzym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci kropli, do postępowania dietetycznego w stanach przejściowych dolegliwości trawiennych (w tym kolki), związanych ze zmniejszoną tolerancją laktozy zawartej w pożywieniu u niemowląt.

#### Skład

Syrop glukozowy, laktaza neutralna, sacharoza, woda, laktaza kwaśna.

Enzymy pochodzenia naturalnego: laktaza kwaśna z wyciągu grzyba *Aspergillus oryzae* i laktaza neutralna z wyciągu drożdży *Kluyveromyces lactis*.

Wartość odżywcza	na 100 ml
Wartość energetyczna	968,4 kJ / 232,2 kcal
Tłuszcz, w tym:	<0,1 g

kwasy tł. nasycone

<0,1 g

Węglowodany, a tym:	92,8 g
cukry	0,24 g
Białko	2,17 g
Sól	0,02 g
Laktaza kwaśna	1,04 g
Laktaza neutralna	0,45 g

### Właściwości

Kolzym rozkładając laktozę zawartą w mleku, zmniejsza dolegliwości kolikowe działając łagodząco, przez co skraca okres płaczu dziecka. Krople mogą być stosowane zarówno podczas karmienia piersią, jak i mlekiem modyfikowanym.

### Wskazania

Może być stosowany u niemowląt już od pierwszych dni życia.

### Sposób użycia

Stosować pod nadzorem lekarza.

Preparat enzymatyczny można podawać do ok. 3- 4 miesiąca życia dziecka, czyli do momentu rozpoczęcia prawidłowej produkcji enzymów przez jelita. Produkt może być stosowany u niemowląt od pierwszych dni życia.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, podawać do każdego posiłku w następujący sposób:

Wiek dziecka	Ilość kropli przypadających na jeden posiłek
Od 0 do 2 tygodni	5
Od 3 do 4 tygodni	6
Od 1 do 2 miesięcy	8
Od 3 do 4 miesięcy	9
Powyżej 4 miesiąca	12

Wstrząsnąć przed użyciem

Karmienie piersią: Po odmierzeniu na łyżeczkę odpowiedniej ilości kropli (zgodnie z tabelą), podać dziecku do spożycia bezpośrednio przed rozpoczęciem karmienia piersią.

Mleko modyfikowane: Przygotować mleko zgodnie z zaleceniami producenta. Krople dodać zgodnie z tabelą do mleka o temperaturze właściwej do podania, wstrząsnąć i podać dziecku. Nie należy przechowywać niespożytego mleka.

Mleko do późniejszego wykorzystania (pokarm naturalny): Do odciągniętego mleka dodać 4 krople Kolzymu i wstawić do lodówki na

minimum 4 godziny. Przed użyciem podgrzać mleko do temperatury właściwej do podania. Nie należy przechowywać niespożytego mleka. Ze względu na pH pokarmu, Inkubację pokarmu naturalnego z preparatem Kolzym cechuje wysoka aktywność laktazy mleka zastępczego - laktazy kwaśnej. Zapewnia to rozkład laktozy zawartej w pokarmie.

Enzym laktaza ulega niszczeniu pod wpływem wysokiej temperatury, stąd preparatu nie należy dodawać do bardzo gorącego mleka.

## Ważne

### Przeciwwskazania i środki ostrożności

Przeciwwskazania: Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. W przypadku zaobserwowania wystąpienia niepokojących objawów u dziecka w trakcie stosowania preparatu Kolzym należy skontaktować się z lekarzem.

Produkt jest niekompletnym środkiem spożywczym. Produkt nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić od światła i bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Nie zamrażać. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zużyć w ciągu 3 tygodni od otwarcia opakowania.