

LACTOVAGINAL 10 kapsułek L!

Cena: 24,90 PLN



Opis słownikowy

Producent BIOMED

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Opis

LACTOVAGINAL 10 kapsułek

Lactovaginal zaleca się stosować w celu przywrócenia lub uzupełnienia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy: profilaktycznie, w stanach zapalnych narządów rodnych, po leczeniu lekami przeciwbakteryjnymi, przeciwrzęsistkowymi, przeciwgrzybiczymi i przy występowaniu upławów.

Wskazania

Lactovaginal stosuje się w celu przywrócenia lub uzupełnienia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy:

profilaktycznie,

w stanach zapalnych narządów rodnych, po leczeniu środkami przeciwbakteryjnymi, przeciwrzęsistkowymi oraz przeciwgrzybiczymi,

przy występowaniu upławów.

Prawidłowa flora bakteryjna pochwy charakteryzuje się obecnością Gram-dodatnich pałeczek z rodzaju Lactobacillus, które stanowią ok. 96% flory bakteryjnej. Czynniki wpływającymi na zmianę składu mikroflory pochwy mogą być:

antybiotykoterapia,
zmiany hormonalne,
chemioterapia, radioterapia,
stres,
przyzwyczajenia higieniczne oraz seksualne.

Zaburzenie równowagi mikrobiologicznej pochwy może prowadzić do różnych stanów chorobowych np.:

bakteryjna waginoza,
grzybica pochwy,
zakażenie bakteriami pochodzącymi z przewodu pokarmowego.

Działanie

Lactobacillus rhamnosus 573, na drodze kwaśnej fermentacji, metabolizuje obecne w środowisku pochwy związki będące źródłem węgla m. in. do kwasu mlekowego, utrzymując tym samym odpowiednie pH pochwy. Kwaśny odczyn pochwy (pH 4,0 – 4,7) **hamuje wzrost bakterii chorobotwórczych**.

Dodatkowo pałeczki L. Rhamnosus 573 wykazują **antagonizm wobec większości bakterii wywołujących zakażenia układu moczowo-płciowego**. Na podstawie badań klinicznych wykazano, że zastosowanie leku Lactovaginal® po uprzednim leczeniu stanów zapalnych pochwy lekami przeciwbakteryjnymi, przeciwgrzybicznymi i przeciwrzęsistkowymi powoduje:

zmniejszenie liczby patogenów,
przywrócenie naturalnej równowagi mikrobiologicznej pochwy,
normalizację wydzieliny z pochwy.

Sposób użycia

Lactovaginal® stosuje się dopochwowo. Najlepsze rezultaty daje stosowanie od 1 do 2 kapsułek na dobę (jedna rano, a druga na noc) przez okres 7 dni. W razie potrzeby leczenie należy powtórzyć.

Kapsułkę leku Lactovaginal® należy umieścić głęboko w pochwie zachowując zasady higieny osobistej tzn. uprzednie umycie okolic intymnych oraz dokładne umycie rąk.

Skład

1 kapsułka zawiera:

pałeczki Lactobacillus rhamnosus 573 około 1010 (w tym nie mniej niż 108 CFU*)

*CFU(ang. Colony Forming Unit) - jednostka tworząca kolonię

