

LAKCID ENTERO 10 kapsułek

LEK

Cena: 21,15 PLN



10 kapsułek LEK PROBIOTYCZNY

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Dawka | 0,25 g |
| Opakowanie | 10 kaps. |
| Postać | kaps.twarde |
| Producent | ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A. |
| Rodzaj rejestracji | Lek |
| Substancja czynna | Saccharomyces boulardii |

Opis produktu

Opis

LEK PROBIOTYCZNY

10 kapsułek twardych

1 kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych suchych drożdżaków *Saccharomyces cerevisiae* var. *boulardii* (synonim ***Saccharomyces boulardii***)

Zapobieganie występowaniu lub leczenie biegunek różnego pochodzenia

Wskazania do stosowania

leczenie ostrych **biegunek infekcyjnych**

nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem *Clostridium difficile*

wspomagająco w leczeniu eradykacyjnym zakażenia *Helicobacter pylori*

zapobieganie **biegunkom podróżnych**

leczenie biegunek występujących w **zespole jelita drażliwego (IBS)**

zapobieganie biegunkom związanym z **żywieniem dojelitowym**

Lakcid Entero jest doustnym lekiem przeciwbiegunkowym, którego substancją czynną są liofilizowane drożdżaki *Saccharomyces cerevisiae* var. *boulardii* (synonim *Saccharomyces boulardii*) zaliczane do probiotyków. Drożdżaki te są składnikiem naturalnej flory jelitowej, której zaburzenia mogą powodować szereg problemów trawiennych prowadzących, m.in. do biegunek.

Dawkowanie

Dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy, młodzież i dorośli

Leczenie ostrych biegunek występujących w zespole jelita drażliwego (leczenie biegunki należy kontynuować przez kilka dni po ustąpieniu objawów); zapobieganie biegunkom podróżnych (przyjmowanie produktu należy rozpocząć 5 dni przed wyjazdem i kontynuować przez cały okres podróży); wspomagająco w leczeniu zakażenia *Helicobacter pylori*: **1 kapsułka 1 do 2 razy na dobę.**

Nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem *Clostridium difficile*: **4 kapsułki na dobę przez okres do 4 tygodni.**

Zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym: **3 kapsułki odpowiadające 750 mg suchych drożdżaków w 1,5 litra roztworu do żywienia dojelitowego na dobę.**

U dzieci w wieku 6 miesięcy do 2 lat leczenie należy przeprowadzić pod nadzorem lekarza.

Przechowywanie

<25°C

Leku probiotycznego Lakcid® ENTERO nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
pobierz ulotkę

Lakcid® to marka leków probiotycznych

Zapobieganie występowaniu lub leczenie biegunek różnego pochodzenia

ZAPOBIEGANIE I LECZENIE BIEGUNKI ZWIĄZANEJ Z ANTYBIOTYKOTERAPIĄ
sprawdź

Lakcid Entero. Skład i postać: Każda kapsułka twarda zawiera 250 mg liofilizowanych (221,25 mg substancji czynnej) suchych drożdżaków *Saccharomyces cerevisiae* var. *boulardii* (synonim *Saccharomyces boulardii*) co odpowiada min. 10 mld żywych komórek/1 g liofilizatu oraz substancje pomocnicze o znanym działaniu: 61,25 mg laktozy bezwodnej i sól. **Wskazania:** Leczenie ostrych biegunek infekcyjnych. Leczenie biegunek występujących w zespole jelita drażliwego (IBS). Zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków. Nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem *Clostridium difficile*, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem. Zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym. Zapobieganie biegunkom podróżnych. Wspomagająco w leczeniu zakażenia *Helicobacter pylori*. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej. Pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko wystąpienia fungemii. **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: 26594 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.08.27.

Lakcid forte. Skład i postać: Każda kapsułka twarda zawiera minimum 10 mld CFU pałeczek *Lactobacillus rhamnosus*: Szczep *Lactobacillus rhamnosus* Pen 40%; Szczep *Lactobacillus rhamnosus* E/N 40%; Szczep *Lactobacillus rhamnosus* Oxy 20%; Pałeczki odporne na: amoksylicynę, ampicylinę, azlocylinę, cefepim, cefotaksym, cefradynę, ceftazydim, cefuroksym, doksycylinę, erytromycynę, gentamycynę, imipenem, klindamycynę, kloksacylinę, kolistynę, kotrimoksazol, kwas nalidyksowy, meropenem, metronidazol, neomycynę, netylmycynę, penicylinę, piperacylinę, streptomycynę, teikoplaninę, tobramycynę, wankomycynę. CFU – jednostka formowania kolonii (ang. Colony Forming Unit). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, laktoza, żółcień pomarańczowa (E110). Każda kapsułka zawiera 115 mg sacharozy i 83 mg laktozy. Kapsułki twarde, celulozowe, składające się z dwóch cylindrycznych części. Przed rekonstytucją proszek w kapsułce ma postać sypkich, rozdrobnionych cząstek o zabarwieniu od jasno do ciemnobieżowego. Po rekonstytucji powstaje homogenna zawiesina, bez widocznych zanieczyszczeń. **Wskazania:** Poantybiotykowe zapalenie jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy; jako leczenie głównie przy nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy. Zapobieganie biegunce podróżnych. Leczenie wspomagające w czasie i po antybiotykoterapii. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (w tym białko mleka krowiego). Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 21228 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.03.18.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

LAK-E/005/05-2022

Wskazania Lakcid Entero jest stosowany w: leczeniu ostrych biegunek infekcyjnych (występujących po spożyciu pokarmów bądź napojów zawierających bakterie chorobotwórcze lub po kontakcie np. z rotawirusami) leczeniu biegunek występujących w zespole jelita drażliwego (IBS) zapobieganiu biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków (biegunka występująca podczas lub po stosowaniu antybiotyku) nawracającej biegunce spowodowanej zakażeniem *Clostridium difficile*, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem zapobieganiu biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym zapobieganiu biegunkom podróżynych wspomagająco w leczeniu zakażenia *Helicobacter pylori*. Lakcid Entero przywraca i pomaga w utrzymaniu prawidłowego składu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, która stanowi naturalną barierę dla rozwoju niekorzystnej mikroflory. Równowaga flory bakteryjnej jest jednak delikatna i może być zaburzona przez wiele czynników, takich jak: wirusy przenoszone drogą kropelkową wirusy w pożywieniu, w zanieczyszczonej wodzie, na brudnych rękach (np. rotawirusy, norowirusy) pierwotniaki, jak *Giardia lamblia* lub pasożyty jelitowe.

Działanie Lakcid Entero jest doustnym lekiem przeciwbiegunkowym, którego substancją czynną są liofilizowane drożdżaki *Saccharomyces cerevisiae* var. *boulardii* (synonim *Saccharomyces boulardii*) zaliczane do probiotyków. Drożdżaki te są składnikiem naturalnej flory jelitowej, której zaburzenia mogą powodować szereg problemów trawiennych prowadzących, m.in. do biegunek.

Sposób użycia Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy, młodzież i dorośli: Leczenie ostrych biegunek i biegunek występujących w zespole jelita drażliwego 1 kapsułka 1 do 2 razy na dobę. Leczenie biegunki należy kontynuować przez kilka dni po ustąpieniu objawów. Zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków 1 kapsułka 1 do 2 razy na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii. Produkt należy przyjmować jeszcze przez kilka dni po zastosowaniu antybiotyków. Nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem *Clostridium difficile* 4 kapsułki na dobę przez okres do 4 tygodni. Zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym 3 kapsułki odpowiadające 750 mg suchych drożdżaków *Saccharomyces cerevisiae* var. *boulardii* w 1,5 litra roztworu do żywienia dojelitowego na dobę. Zapobieganie biegunkom podróżynych 1 kapsułka 1 do 2 razy na dobę. Przyjmowanie produktu należy rozpocząć 5 dni przed wyjazdem i kontynuować przez cały okres podróży. Wspomagająco w leczeniu zakażenia *Helicobacter pylori*. 1 kapsułka 2 razy na dobę. U dzieci w wieku 6 miesięcy do 2 lat leczenie należy przeprowadzić pod nadzorem lekarza.

Sposób podawania Podanie doustne. Kapsułkę należy połknąć popijając odpowiednią ilością płynu (najlepiej szklanką wody). Lek należy przyjmować przed posiłkiem. Dla pacjentów, którzy mają problemy z połknięciem oraz dla dzieci w wieku poniżej 6 lat, jak również przy karmieniu przez zgłębnik, kapsułkę należy otworzyć, a jej zawartość wymieszać odpowiednio z pokarmem lub z płynem (temperatura pokojowa) lub z roztworem do żywienia dojelitowego. Czas stosowania Nie są znane ograniczenia czasu stosowania probiotyków. **Ważne** Kiedy nie stosować leku Lakcid Entero? Jeśli pacjent ma uczulenie na drożdże lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Jeśli pacjent ma założone wkłucie do żyły centralnej. Jeśli pacjent ma obniżoną odporność lub jest hospitalizowany z powodu ciężkich chorób lub zaburzeń (osłabienia) układu odpornościowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem stosowania leku Lakcid Entero należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Skład Substancją czynną leku jest *Saccharomyces cerevisiae* var. *boulardii*. Każda kapsułka twarda zawiera 250 mg liofilizowanych (221,25 mg substancji czynnej) suchych drożdżaków *Saccharomyces cerevisiae* var. *boulardii* (synonim *Saccharomyces boulardii*) co odpowiada min. 1010 żywych komórek/1 g liofilizatu. Pozostałe składniki to: laktoza bezwodna, magnezu stearynian, żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), kompleks miedziowy chlorofilu (E141), żelaza tlenek żółty (E172), woda, sodu dodecylosiarczan.

Galeria

Lakcid
 ENTERO

**ZAPOBIEGANIE WYSTĘPOWANIU
 LUB LECZENIE BIEGUNEK RÓŻNEGO
 POCHODZENIA**

- biegunki infekcyjne
- biegunki podróżynych
- Clostridium difficile*
- jelito drażliwe (IBS)
- Helicobacter pylori*
- żywienie dojelitowe

10 kapsułek LEK PROBIOTYCZNY

Lakcid
 ENTERO



1 kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych suchych drożdżaków *Saccharomyces cerevisiae* var. (synonim *Saccharomyces boulardii*).

10 kapsułek LEK PROBIOTYCZNY

Lakcid
 ENTERO

DAWKOWANIE

- 1/2/24h / 24h ostre biegunki, biegunki podróżynych i w IBS, *Helicobacter pylori*
- 1/2/24h / 24h biegunki spowodowane zakażeniem *Clostridium difficile*
- 1/2/24h / 24h zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym

LAK-EP/09/10-2022

10 kapsułek LEK PROBIOTYCZNY