

LEVOFREE roztwór doustny 6mg/ml 120 ml



Cena: 14,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka	6 mg/ml
Opakowanie	120 ml (but.)
Postać	roztw.doust.
Producent	TEVA B.V.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Levodropropizynium

Opis produktu

Wskazania Levodropropizyna - substancja czynna leku charakteryzuje się głównie obwodowym (o punkcie uchwytu w oskrzelach i tchawicy) działaniem przeciwkaszlowym oraz działaniem przeciwuczuleniowym i znoszącym skurcz oskrzeli. Levofree jest stosowany w objawowym leczeniu suchego kaszlu (kaszel nieproduktywny). Levofree jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 2 lat i starszych. **Działanie** Levofree zawiera substancję czynną lewodropropizynę, która należy do grupy leków przeciwkaszlowych (środków przeciwkaszlowych). **Sposób użycia** Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zaleca się przyjmowanie leku między posiłkami. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat Zalecana dawka to pojedyncza dawka 10 ml leku Levofree (co odpowiada 60 mg lewodropropizyny) do trzech razy na dobę. Należy zachować odstęp 6 godzin pomiędzy dawkami. Dzieci w wieku od 2 do 12 lat Zalecana całkowita dawka dobową to 0,5 ml roztworu doustnego na kg masy ciała (co odpowiada 3 mg lewodropropizyny/kg masy ciała), podzielona na 3 pojedyncze dawki w odstępie co najmniej 6 godzin pomiędzy dawkami. 10-15 kg: pojedyncza dawka: 2 ml / całkowita dawka dobową w ciągu 24 godzin: 6 ml 16-20 kg: pojedyncza dawka: 3 ml / całkowita dawka dobową w ciągu 24 godzin: 9 ml 21-27 kg: pojedyncza dawka: 4 ml / całkowita dawka dobową w ciągu 24 godzin: 12 ml 28-32 kg: pojedyncza dawka: 5 ml / całkowita dawka dobową w ciągu 24 godzin: 15 ml 33-39 kg: pojedyncza dawka: 6 ml / całkowita dawka dobową w ciągu 24 godzin: 18 ml 40-42 kg: pojedyncza dawka: 7 ml / całkowita dawka dobową w ciągu 24 godzin: 21 ml W uzasadnionych przypadkach, całkowita dawka dobową może zostać zwiększona do 1 ml roztworu doustnego na kg masy ciała. Lek należy stosować do ustąpienia kaszlu, ale nie należy stosować Levofree dłużej niż 7 dni. Jeśli kaszel nie ustępuje lub nasila się, należy skonsultować się z lekarzem. **Ważne!** Interakcje: Levofree podczas ciąży i karmienia piersią: Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować leku Levofree w okresie ciąży lub karmienia piersią, ponieważ w badaniach na zwierzętach wykazano, że substancja czynna przenika przez barierę łożyskową, a także została wykryta w mleku matki. Levofree a prowadzenie pojazdów: Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn. Nawet stosowany zgodnie z przeznaczeniem Levofree może zmienić czas reakcji w taki sposób, że osłabia zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn. Dodatkowe informacje: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Levofree a inne leki: Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Chociaż w badaniach klinicznych nie zgłaszano interakcji z benzodiazepinami, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Levofree ze środkami uspokajającymi u

