

LEVOPRONT 60mg/10ml syrop 120 ml kaszel suchy



lek OTC

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Producent ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Lek

LEK NA SUCHY KASZEL

syrop dla dzieci powyżej 2 lat i dla dorosłych

Levo/P/SecIm/01/2022

Opis produktu

Wskazania LEVOPRONT 60mg/10ml syrop 120 ml Levopront to lek na kaszel suchy, który hamuje odruch kaszlowy w drogach oddechowych¹, a nie w ośrodkowym układzie nerwowym. Levopront wskazany jest do stosowania w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu u dzieci powyżej 2 lat i u dorosłych. **Działanie** Syrop Levopront zawiera substancję czynną lewodropropizynę o działaniu przeciwkaszlowym i znoszącym skurcz oskrzeli. Co ważne, nie działa hamująco na ośrodek oddechowy i nie zaburza oczyszczania śluzowo-rzęskowego w drogach oddechowych¹. Nie wchodzi także w interakcje z wieloma lekami stosowanymi w chorobach układu oddechowego¹. Wiele danych wskazuje, że lek ten skutecznie hamuje kaszel suchy o różnym pochodzeniu, jak np.: kaszel związany z zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowych kaszel w przebiegu raka płuc kaszel w przebiegu krztuśca. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.¹⁾ **Charakterystyka Produktu Leczniczego Levopront** **Sposób użycia** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku Levopront dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem. Stosowanie u dzieci od 2 lat: 10-20 kg: 3 ml syropu 3 razy na dobę; 20-30 kg: 5 ml syropu 3 razy na dobę. Stosowanie u dorosłych: 10 ml syropu do 3 razy na dobę. **Sposób użycia** Levopront należy stosować doustnie, 3 razy na dobę w odstępach co najmniej 6 godzin. Do butelki z syropem dołączona jest miarka pozwalająca odmierzyć m.in. 3, 5 i 10 ml. Butelka jest zaopatrzona w dodatkowe zabezpieczenie jakim jest zakrętka z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci. Aby otworzyć butelkę należy nacisnąć zakrętkę i obracać w kierunku wskazanym przez strzałkę. Leczenie należy kontynuować do czasu ustąpienia kaszlu lub zgodnie z zaleceniem lekarza. W każdym przypadku, gdy kaszel nie ustępuje po 7 dniach leczenia zaleca się przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza. Należy pamiętać, że kaszel jest objawem choroby i należy rozpoznać, a następnie leczyć chorobę, która jest jego przyczyną. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. **Ważne** Kiedy nie stosować leku Levopront: jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek); u kobiet w ciąży i karmiących piersią. **Skład** Substancją czynną leku jest lewodropropizyna. 10 ml syropu zawiera 60 mg lewodropropizyny. Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, substancja poprawiająca smak i zapach wiśniowa, metylu parahydroksybenzoatan, propylu parahydroksybenzoatan, woda oczyszczona. Postać farmaceutyczna: syrop.

Galeria

LEVOPRONT hamuje odruch kaszlu w drogach oddechowych*

Kaszel u dzieci

Kaszel u dorosłych

DLA CAŁEJ RODZINY OD 25. MIESIĄCA ŻYCIA

*Charakterystyka Produktu Leczniczego Levopront. Levop/Secim/01/2022

LEVOPRONT

to lek na kaszel suchy, który hamuje odruch kaszlowy w drogach oddechowych*, a nie w ośrodkowym układzie nerwowym.

DZIAŁANIE OŚRODKOWE polega na hamowaniu ośrodka kaszlu w mózgu.

DZIAŁANIE OBWODOWE polega na hamowaniu odruchu kaszlu w drogach oddechowych, substancją o takim działaniu jest *Levodropropizyna*.

64 070 Levop/Secim/01/2022

LEVOPRONT

- Hamuje odruch kaszlu w drogach oddechowych*
- Nie wchodzi w interakcje z wieloma lekami stosowanymi w chorobach układu oddechowego*
- Nie działa hamująco na ośrodek oddechowy*
- Nie zaburza oczyszczania śluzowo-rzęskowego w drogach oddechowych*
- Może być stosowany u dzieci już od 25 miesiąca życia*

64 070 Levop/Secim/01/2022

Dawkowanie leku LEVOPRONT

DZIECI POWYŻEJ 2 ROKU ŻYCIA		DOROŚLI
3 ML	5 ML	10 ML
10 20 30 KG		DO 3 x NA 24 H W ODSTĘPACH MIN. 6 H
3 x NA 24 H		

Levop/Secim/01/2022