

LIBRAMED 84 tabletki

Cena: 65,90 PLN



DO KONTROLI WAGI

Opis produktu

Właściwości Libramed, dzięki Policaptil Gel Retard®, WSKAZANIA Libramed, połączony ze zrównoważoną dietą, prawidłowym przyjmowaniem płynów oraz regularną aktywnością fizyczną, dzięki swojemu mechanizmowi działania, wskazany jest do kontroli wagi u dorosłych i u dzieci powyżej 8. roku życia. **Sposób użycia** Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia 3 tabletki przed dwoma głównymi posiłkami. Dzieci między 8. a 12. rokiem życia 2 tabletki przed dwoma głównymi posiłkami. Zażyć zalecaną dawkę, popijając pełną szklanką wody i połykając po jednej tabletkę na raz. Nie żuć i nie rozgryzać tabletki. Osoby mające problemy z połykaniem mogą rozpuścić tabletki Libramed w letniej wodzie lub w herbatkach ziołowych niesłodzonych, mieszając do ich całkowitego rozpuszczenia. Uzyskany napój należy spożyć w ciągu kilku minut, zanim zamieni się w żel. **Ważne** Zaleca się przyjęcie produktu przynajmniej dwie godziny przed lub po zażyciu leków, aby nie zakłócać ich wchłaniania. Nie zażywać w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników. Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Okres ważności dotyczy produktu zamkniętego i właściwie przechowywanego. Produkt nie zastępuje zróżnicowanej diety. Należy przestrzegać niskokalorycznej diety i dbać o regularną aktywność fizyczną. W przypadku stosowania diety przez okres dłuższy niż trzy tygodnie zaleca się skonsultowanie z lekarzem. **Składniki** Opatentowany kompleks makrocząsteczek polisacharydowych (Policaptil Gel Retard®); aromaty pomarańczowe, jabłkowe i cytrynowe. **Producent** Aboca Polska Sp. z o.o. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	84 tabl. (butelka)
Postać	tabl.
Producent	ABOCA POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-