

## LIX 0,5% krople do uszu 7 g



Cena: 21,95 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	7 g
Postać	krople do uszu, roztwór
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Właściwości**LIX krople do uszu to wyrób medyczny, którego działanie oparte jest na osmotycznych właściwościach glicerolu. Głównym składnikiem kropli Lix jest glicerol. Związek chemiczny występujący naturalnie w tłuszczach oraz olejach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Glicerol wykazuje dwie podstawowe cechy istotne z punktu widzenia jego stosowania w kroplach do uszu: oleista konsystencja glicerolu, która powoduje jego łagodne przyleganie do skóry w miejscu aplikacji i odpowiada za jego właściwości ochronne oraz higroskopijność glicerolu, która z kolei sprawia, iż podany miejscowo glicerol usuwa wodę z obrzękniętych tkanek (efekt osmotyczny) w wyniku czego zmniejsza się obrzęk, a w efekcie nasilenie bólu. Glicerol w wyrobie medycznym Lix zmiękcza woskową, pomaga w jej usunięciu oraz dzięki swoim właściwościom wiążącym wodę usuwa nadmiar płynu z tkanek przewodu słuchowego (działanie osmotyczne) prowadząc tym samym do zniesienia dolegliwości występujących w stanach zapalnych ucha takich jak ból ucha czy obrzęk. Glicerol wykazuje działanie przyczynowe. Lidokaina zastosowana pomocniczo w kroplach Lix jako środek powierzchniowo znieczulający, nasila to działanie i dodatkowo łagodzi ból ucha. **Sposób użycia**Przed zastosowanie wyrobu należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania! Umyć ręce i następnie odkręcić zakrętkę z butelki. Przechylić głowę lub położyć się na boku tak, aby leczone ucho było zwrócone do góry. Delikatnie pociągnąć płatek ucha (dolną część małżowiny usznej) w kierunku od szyi. Odkręconą butelkę Lix odwrócić do góry dnem i naciskając ją obustronnie odmierzyć 1-2 krople wyrobu do ucha. Przez kilka minut trzymać głowę przechyloną tak, aby krople mogły spłynąć do przewodu słuchowego. Nadmiar płynu wytrzeć czystą chusteczką. Dodatkowo zalecane jest zatkanie przewodu ucha zewnętrznego po aplikacji watą. Zakręcić butelkę. **Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:** 2 krople do każdego ucha maksymalnie trzy razy na dobę. **Dzieci od 6 miesiąca życia:** 2 krople do każdego ucha maksymalnie trzy razy na dobę. W przypadku stosowania u dzieci, konieczne jest zabezpieczenie ucha watą. Jeśli po upływie 3 dni nie dojdzie do poprawy lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem. **Ważne**Przeciwwskazania i środki ostrożnościPreparatu Lix nie należy stosować, jeśli: Opakowanie zostało uszkodzone; Przy perforacji błony bębenkowej ucha (np. w przypadku przewlekłego zapalenia ucha środkowego); Lix należy stosować wyłącznie po dokładnym badaniu otoskopowym przez lekarza; Stwierdzono wcześniej uczulenie na którykolwiek ze składników wyrobu; Upłynął termin ważności wydrukowany na opakowaniu; Pacjent jest bezpośrednio po operacji lub zabiegu chirurgicznym przeprowadzonym w obrębie ucha; U dzieci poniżej 6 miesiąca życia; Przy przedłużającym się bólu lub obrzęku, wywołanym stanem zapalnym o podłożu bakteryjnym lub grzybiczym - dolegliwości te wymagają kontaktu z lekarzem; W przypadku wystąpienia wydzieliny z ucha - wycieku z ucha; Nie należy stosować Lix do ucha z założonym aparatem słuchowym, Lix należy zaaplikować godzinę przed założeniem aparatu słuchowego do przewodu słuchowego zewnętrznego; W przypadku nasilenia się objawów lub braku poprawy po trzech dniach stosowania kropli do uszu Lix albo w przypadku wystąpienia gorączki należy skontaktować się z lekarzem. Przedłużający

się ból lub obrzęk może sygnalizować zakażenie bakteryjne lub grzybicze, które może wymagać wdrożenia dalszego i bardziej odpowiedniego leczenia; Wyłącznie do użytku zewnętrznego; Należy unikać kontaktu z oczami, jamą ustną i błoną śluzową gardła oraz nosa; Lix przeznaczony jest do doraźnego łagodzenia dolegliwości bólowych ucha, nie dłużej niż 3 dni i nie powinien być stosowany przewlekłe. Jeśli po upływie 3 dni nie dojdzie do poprawy lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować po upływie terminu ważności. Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone. **Składniki** 0,5% roztwór chlorowodorku lidokainy w glicerolu (bezwodnym). **Producent** ADAMED Pięńków 149 Czosnów