

LOPER 2 mg 10 tabletek

Cena: 4,90 PLN



Opis słownikowy

Dawka	2 mg
Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabl.
Producent	SUN-FARM SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Loperamidum

Opis produktu

WskazaniaLOPER 2 mg 10 tabletekLek Loper jest wskazany w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki.U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego lek Loper może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji.Lek Loper jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.**Działanie**Substancją czynną leku Loper jest loperamidu chlorowodorek.Loperamidu chlorowodorek jest doustnym lekiem przeciwbiegunkowym.Zmniejsza perystaltykę jelit, wydłuża czas przechodzenia treści pokarmowej przez jelita. Ponadto zwiększa spoczynkowe napięcie zwieracza odbytu, jednocześnie zmniejszając natychmiastową potrzebę wypróżnienia (parcie na stolec).**Sposób użycia**Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:Ostra biegunka: początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) dla dorosłych i 1 tabletką (2 mg) dla dzieci, a następnie 1 tabletką (2 mg) po każdym kolejnym luźnym stolcu.Przewlekła biegunka: początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) na dobę dla dorosłych i 1 tabletką (2 mg) na dobę dla dzieci; tę początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1 do 2 normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej od 1 do 6 tabletek (od 2 do 12 mg) na dobę.Dawka maksymalna w ostrej i przewlekłej bieguncie - 8 tabletek (16 mg) na dobę dla dorosłych i dzieci.U dzieci dawka leku musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg mc./dobę) - jednak nie więcej niż 8 tabletek (16 mg) na dobę.Nie należy stosować dawki większej niż maksymalna zalecana dawka.Jeśli w ciągu 48 godzin pn zastosowaniu leku Loper objawy nie ustąpią albo nasiliły się lub / i pojawiają się inne (np. gorączka) należy koniecznie zasięgnąć porady lekarskiej.Stosowanie leku Loper należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit.**Ważne**PrzeciwwskazaniaKiedy nie stosować leku LoperJeśli pacjent ma uczulenie na loperamidu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.U dzieci w wieku poniżej 6 lat.Jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką; u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelit; u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter, u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania.W przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, - rozszerzenia okrężnicy i toksycznego rozszerzenia okrężnicy.**Skład**Substancją czynną leku jest loperamidu chlorowodorek.Jedna tabletką zawiera 2 mg loperamidu chlorowodoru.Pozostałe składniki leku to: skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, powidon K-30, błękit brylantowy FCF (E133), żółcień chinolinowa (E104), magnezu stearynian, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A).