

## MAALOX 400 mg + 400 mg 20 tabletek



Cena: 10,49 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	400mg+400mg
Opakowanie	20 tabl. (2 blist. po 10 tabl.)
Postać	tabl.
Producent	Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Alumini hydroxydum, Magnesii hydroxidum

### Opis produktu

**Wskazania**Maalox to produkt leczniczy stosowany w leczeniu objawowym nadkwaśności, zgadze, nieżycie żołądka. Lek wykazuje działanie zobojętniające, ściągające, osłaniające błonę śluzową żołądka i dwunastnicy. **Działanie**Maalox jest wskazany w leczeniu objawowym nadkwaśności i dolegliwości ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego jak: nieżyt żołądka, zarzucanie wsteczne treści żołądka do przełyku w przebiegu przepukliny rozworu przełykowego przepony, niestrawność, zgaga z powodu nadkwaśności. Maalox może być stosowany pomocniczo w leczeniu: choroby wrzodowej dwunastnicy, choroby wrzodowej żołądka. Maalox posiada działanie zobojętniające, ściągające, osłaniające błonę śluzową żołądka i dwunastnicy. Maalox nie wpływa bezpośrednio na wydzielanie kwasu solnego w żołądku, obniża stężenie kwasu w świetle przełyku. **Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. 1-2 tabletki należy ssać lub żuć po posiłku, lub w czasie bólu. **Ważne**Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): biegunki lub zaparcia. Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): nudności, wymioty, jasne zabarwienie stolca, hipermagnezemia. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy), hiperalbuminemia, hipofosfatemia, ból brzucha. **Skład**Substancjami czynnymi są: wodorotlenek glinu, wodorotlenek magnezu. 1 tabletki zawiera 400 mg wodorotlenku glinu, 400 mg wodorotlenku magnezu. Substancje pomocnicze: mannitol, sorbitol, sacharyna sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, sacharoza zawierająca 3% skrobi, sacharoza. 1 tabletki zawiera 150 mg sacharozy.

Galeria

