

# MAXISEPTIC (1mg+0,02g) aerozol do stosowania na skórę 250 ml



Cena: 26,75 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	(1mg+0,02g)/ml
Opakowanie	1 but.a 250ml
Postać	aer.na skórę, roztwór
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Octenidini dihydrochl., Phenoxyethanol.

## Opis produktu

### Opis

Kiedy stosować? Jak działa? Co zawiera Jak stosować? Szczegóły produktu

### Maxi ochrona skóry

Kiedy stosować MaxiSeptic?

TO AEROZOL NA SKÓRĘ, ROZTWÓR:

stosować przy leczeniu antyseptycznymw obrębie błon śluzowych

do dezynfekcji skóry przed zabiegami

leczenie antyseptyczne małych, powierzchownych ran

czasowo - wspomaganie leczenia grzybicy międzypalcowej

Jak działa MaxiSeptic?

Bakteriobójczo<sup>1</sup>

działanie na zarówno bakterie Gram – dodatnie jak i Gram – ujemne

Grzybobójczo<sup>2</sup>

skuteczność oktenidyny przeciwko *Candida albicans*, *Epidermophyton floccosum*, leczenie grzybicy jest uzupełniające (do terapii przeciwgrzybiczej)

Przeciwkopierwotnikom<sup>1</sup>

w tym *Trichomonas* spp.

1. Charakterystyka produktu leczniczego Maxiseptic.

2. Junka A. Nowoczesne antyseptyki – definicje, obszar zastosowania, mechanizmy działania i oporności. Forum Zakażeń 2010; 1(3-4): 43-51.

MaxiSeptic jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku.

Co zawiera MaxiSeptic?

Fenoksyetanol: Działanie: zwiększa przepuszczalność błony komórkowej dla jonów potasu.

Oktenidyna: Działanie: wchodzi w reakcje ze ścianą komórkową i składnikami błony komórkowej drobnoustrojów, prowadząc tym samym do zaburzenia czynności komórek.

Jak stosować MaxiSeptic?

Maxiseptic należy nanosić raz na dobę spryskując leczony obszar, zapewniając całkowite zwilżenie. Alternatywnie, można również

spryskać produktem gazik i delikatnie przetrzeć leczony obszar. Aplikacja za pomocą gazików jest metodą preferowaną.

W każdym wypadku, po podaniu, należy zawsze zapewnić czas działania wynoszący co najmniej jedną do dwóch minut przed przystąpieniem do dalszych działań (np. założenia opatrunku). Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek procedury medycznej należy pozostawić produkt leczniczy Maxiseptic do całkowitego wyschnięcia.

W przypadku ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej produkt należy nakładać na zmienione obszary rano i wieczorem (patrz dawkowanie i sposób podawania). Aby osiągnąć pożądaną wynik, należy ściśle przestrzegać tych instrukcji.

Jak dotąd dostępne są wyłącznie dane dotyczące stosowania produktu w sposób ciągły przez nie dłużej niż 14 dni. Dlatego też produktu leczniczego Maxiseptic nie należy stosować dłużej niż przez 2 tygodnie bez nadzoru lekarza.

Dzieci i młodzież. Dawkowanie produktu leczniczego Maxiseptic jest takie samo u dorosłych i dzieci.

Sposób podawania: podawanie na skórę. Maxiseptic jest przeznaczony do stosowania na powierzchnię skóry i nie może być podawany, np. za pomocą strzykawki, do głębokich warstw tkanki. Maxiseptic jest zalecany do stosowania w postaci nierozcieńczonej.

Zobacz również

MaxiBiotic jeden lek, 3 aktywne składniki

Szczegóły produktu

Skład Dawkowanie i sposób podawania Opakowanie Inne informacje

1 ml roztworu zawiera 1 mg oktenidyny dichlorowodoru (Octenidinum dihydrochloridum) i 20 mg fenoksyetanolu (Phenoxyethanolum).

Aerazol na skórę, roztwór. Przezroczysty, bezbarwny roztwór o charakterystycznym zapachu.

Maxiseptic należy nanosić raz na dobę spryskując leczony obszar, zapewniając całkowite zwilżenie. Alternatywnie, można również spryskać produktem gaziki i delikatnie przetrzeć leczony obszar. Aplikacja za pomocą gazików jest metodą preferowaną. W każdym wypadku, po podaniu, należy zawsze zapewnić czas działania wynoszący co najmniej jedną do dwóch minut przed przystąpieniem do dalszych działań (np. założenia opatrunku). Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek procedury medycznej należy pozostawić produkt leczniczy Maxiseptic do całkowitego wyschnięcia. W przypadku ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej produkt należy nakładać na zmienione obszary rano i wieczorem. Aby osiągnąć pożądaną wynik, należy ściśle przestrzegać tych instrukcji. Jak dotąd dostępne są wyłącznie dane dotyczące stosowania produktu w sposób ciągły przez nie dłużej niż 14 dni. Dlatego też produktu leczniczego Maxiseptic nie należy stosować dłużej niż przez 2 tygodnie bez nadzoru lekarza. Dzieci i młodzież Dawkowanie produktu leczniczego Maxiseptic jest takie samo u dorosłych i dzieci. Sposób podawania: Podanie na skórę. Maxiseptic jest przeznaczony do stosowania na powierzchnię skóry i nie może być podawany, np. za pomocą strzykawki, do głębokich warstw tkanki. Maxiseptic jest zalecany do stosowania w postaci nierozcieńczonej.

50 ml

250 ml

Maxiseptic jest wskazany do: wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiednich tkanek przed procedurami diagnostycznymi w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądźci prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego; leczenia antyseptycznego małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi; ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej. Maxiseptic jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku.

Produktu leczniczego Maxiseptic nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu leczniczego Maxiseptic nie należy stosować do płukania jamy brzusznej (np. śródoperacyjnie), pęcherza moczowego ani błony bębenkowej.

Podmiot odpowiedzialny PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23659 wydane przez URPL. Maj 2017.

#### Skład

1 ml roztworu zawiera 1 mg oktenidyny dichlorowodoru (*Octenidinum dihydrochloridum*) i 20 mg fenoksyetanolu (*Phenoxyethanolum*).

Aerozol na skórę, roztwór. Przezroczysty, bezbarwny roztwór o charakterystycznym zapachu.

#### Stosowanie

Maxiseptic należy nanosić raz na dobę spryskując leczony obszar, zapewniając całkowite zwilżenie. Alternatywnie, można również spryskać produktem gaziki i delikatnie przetrzeć leczony obszar. Aplikacja za pomocą gazików jest metodą preferowaną. W każdym wypadku, po podaniu, należy zawsze zapewnić czas działania wynoszący co najmniej jedną do dwóch minut przed przystąpieniem do dalszych działań (np. założenia opatrunku). Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek procedury medycznej należy pozostawić produkt leczniczy Maxiseptic do całkowitego wyschnięcia. W przypadku ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej produkt należy nakładać na zmienione obszary rano i wieczorem. Aby osiągnąć pożądany wynik, należy ściśle przestrzegać tych instrukcji. Jak dotąd dostępne są wyłącznie dane dotyczące stosowania produktu w sposób ciągły przez nie dłużej niż 14 dni. Dlatego też produktu leczniczego Maxiseptic nie należy stosować dłużej niż przez 2 tygodnie bez nadzoru lekarza. Dzieci i młodzież Dawkowanie produktu leczniczego Maxiseptic jest takie samo u dorosłych i dzieci. Sposób podawania: Podanie na skórę. Maxiseptic jest przeznaczony do stosowania na powierzchnię skóry i nie może być podawany, np. za pomocą strzykawki, do głębokich warstw tkanki. Maxiseptic jest zalecany do stosowania w postaci nierozcieńczonej.

#### Opakowanie

50 ml

250 ml

#### Inne informacje

Maxiseptic jest wskazany do: wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiednich tkanek przed procedurami diagnostycznymi w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądźci prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego; leczenia antyseptycznego małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi; ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej. Maxiseptic jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku.

Produktu leczniczego Maxiseptic nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu leczniczego Maxiseptic nie należy stosować do płukania jamy brzusznej (np. śródoperacyjnie), pęcherza moczowego ani błony bębenkowej.

Podmiot odpowiedzialny PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23659 wydane przez URPL. Maj 2017.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

nr Max-PL-1911-052