

MAXON FORTE 50 mg 4 tabletki, na erekcję

Cena: 27,95 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,05 g
Opakowanie	4 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Sildenafilum

Opis produktu

Opis

Sildenafil 50 mg, 4 tabletki powlekane

Najwyższa dawka sildenafilu dostępna bez recepty¹

JAK DZIAŁA LEK?

MAXON FORTE wspomaga rozkurcz mięśni gładkich w ciałach jamistych², powodując zwiększenie napływu krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

Rewolucja bez recepty na zaburzenia erekcji. Poprawia jakość życia seksualnego. Jedna z najlepszych substancji na świecie w leczeniu zaburzeń erekcji. Dostępny jedynie w aptekach.

OCENY PRODUKTU

Super działanie, stał wcześniej na pół możliwości po delikatnych pieszczotach twardość jak za dawnych lat. Partnerka mówi, że takich orgazmów za jednym razem jeszcze nie miała!

Wyśmienity! Po godzinie była pierwsza fala z 30 min akcją, potem po trzech godzinach była 2 fala z 20 min akcją, trzeciej fali nie było, bo partnerka uciekła.

Nie więcej niż 1 zaraz potem wszystko pracuje tak jak ma ;-) po 2 zaraz głowa boli!

Znakomity! Panowie, nie warto się męczyć, jak coś niedostatecznie działa :D To proste, skuteczne i TANIE rozwiązanie, by życie wróciło do 100%.

Bardzo dobre polecam i skuteczne szkoda że nie ma w sprzedaży tabletek 100 mg.

Wypadła mi 1 tabletką na niebezpiecznym zakręcie. To nawet jego wyprostowało.

to naprawdę działa, jeden numerek, 10 min. przerwy i kolejny ,jak za młodych lat POLECAM!!!!

Produkt który w moim wieku jest niezastąpiony i pozwala cieszyć się życiem.

CZY WIESZ, ŻE...

1.7 mln

Polaków cierpi na problemy z erekcją³

65%

Z nich nigdy nie powiedziało o tym lekarzowi³

80%

Polaków przy wyborze specyfiku kieruje się łatwością dostępu (bez recepty)³

JAK DZIAŁA SYLDENAFIL?

Może być stosowany nie tylko w przypadku niewielkiego nasilenia dolegliwości związanych z zaburzeniami erekcji. Wśród chorych, którzy wcześniej korzystali z innych metod leczenia zaburzeń erekcji, jego przyjmowanie staje się preferowaną formą terapii. U wielu leczonych pacjentów podawanie syldenafile powoduje poprawę potencji w zadowalającym ich stopniu, co skutkuje wzrostem komfortu życia⁴. Działanie syldenafile potwierdzono u różnych grup pacjentów z zaburzeniami erekcji, również tych cierpiących dodatkowo na przykład na cukrzycę, depresję, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, chorobę niedokrwienną serca, będących po operacji gruczołu krokowego czy w podeszłym wieku².

Poprawia jakość Życia seksualnego

1 tabletk⁵

MAXON FORTE 50 mg syldenafile

5 godzin⁵

Maksymalny czas działania Wymaga stymulacji seksualnej

12 minut⁵

Tyle wystarczy by zadziałała Zażyj przed stosunkiem

CZY MOGĘ ZAŻYWAĆ MAXON FORTE?

Sprawdź to wypełniając ankietę bezpieczeństwa!

[Przejdź do ankiety](#) [Przejdź do ankiety PDF](#)

WYBIERZ ROZMIAR OPAKOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB

2 tabletki

4 tabletki
NOWOŚĆ

Maxon FORTE. Spróbuj sam. Podziękujesz nam później.
POBIERZ CHPL6 POBIERZ ULOTKĘ POBIERZ IOL7

PRZECZYTAJ ULOTKĘ

Skład

Każda tabletką powlekana zawiera 50 mg sylденаfilu w postaci sylденаfilu cytrynianu.

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy MAXON FORTE jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prężą wystarczającą do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego MAXON FORTE niezbędna jest stymulacja seksualna.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Przeciwwskazane jest równoczesne stosowanie sylденаfilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiegokolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie syldenafilu, i leków takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produkt leczniczy MAXON FORTE jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi <90/50 mmHg), po niedawno przeżytym udarze lub zawale serca, oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa. Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

Dawkowanie i sposób podania

Stosowanie u dorosłych Jeśli pacjent stosował wcześniej produkty lecznicze zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecaną dawką jest 50 mg syldenafilu przyjmowane, w zależności od potrzeb, około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. W przeciwnym razie produkt leczniczy MAXON FORTE w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie odczuł pożądanego efektu (czyli nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku). **Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego częściej niż raz na dobę. Jeżeli produkt leczniczy MAXON FORTE jest przyjmowany podczas posiłku, początek działania leku może być opóźniony w porównaniu do przyjęcia leku na czczo (patrz punkt 5.2). W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, może on zalecić dawkę początkową 50 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji produktu leczniczego, lekarz może dawkę zwiększyć do 100 mg lub zmniejszyć do 25 mg.**

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów.

[1] Maxon Forte zawiera najwyższą dawkę syldenafilu dostępną bez recepty na polskim rynku <http://www.leksykon.com.pl/szukaj-leku.html> (dostęp 09.12.2020).

[2] Inhibitory fosfodiesterazy typu 5 – podobieństwa i różnice. Z. Lew-Starowicz. Seksuologia Polska 2003, 1, 2, 79–82.

[3] Według danych Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej Badanie przeprowadzone metodą CAWI przez GfK Polonia w lutym 2016 r. Analizą objęto reprezentatywną grupę 600 Polaków w wieku 40-65 lat, u których występowanie problemów z potencją zostało stwierdzone na podstawie odpowiedzi na pytania kwestionariusza IIEF5.

[4] B. Pawlicki, Leczenie zaburzeń erekcji iniekcjami do ciał jamistych, „Seksuologia Polska” 2003, 1 (1), str. 31-34.

[5] Zgodnie z CHPL.

[6] Charakterystyka Produktu Leczniczego.

[7] Informacja o leku.

[8] Opinie są oryginalną pisownią i pochodzą z serwisu Ceneo.

MAO/08510/05/21

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Wskazania MAXON FORTE 50 mg 4 tabletki Produkt leczniczy MAXON FORTE jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego MAXON FORTE niezbędna jest stymulacja seksualna. **Działanie** Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Maxon pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. **Sposób użycia** Lek powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. **Ważne** Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Przeciwwskazane jest równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiegokolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie syldenafilu, i leków takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produkt leczniczy MAXON FORTE jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mmHg), po niedawno przebytych udarze lub zawale serca, oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa. Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. **Skład** Każda tabletki powlekana zawiera 50 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu.